رقم الترتيب :
رقم التسلسل :

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية علوم الطبيعة والحياة
قسم البيولوجيا

مذكرة تخرج

لنيل شهادة ماستر أكاديمي

ميدان: علوم الطبيعة و الحياة

شعبة: علوم بيولوجية

تخصص: التنوع البيئي و فزيولوجيا النبات
الموضوع

تأثير النقع بمنظم النمو GA3 على خصائص انبات بعض
اصناف الكينوا (*Chenopodium quinoa willd*)

النامية في وسط ملحي

من إعداد:

فرحات مسعودة و زكور فرحات صفاء و بيكي صفاء

لجنة المناقشة:

بن قدور منية	أستاذ محاضر ب	رئيسا	جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
د. خراز خالد	أستاذ محاضر ب	مؤطرا	جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
غمام عمارة الجيلاني	أستاذ محاضر أ	مؤطر مساعد	جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
بالحبيب عبد الحميد	أستاذ مساعد أ	مناقشا	جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

الموسم الجامعي : 2020-2021

تشكرات

نبدأ أولاً شكريا لله الذي بفضلہ أتمننا مذكرتنا على أكمل وجه بعد الصعوبات التي واجهتنا خلال هذه الفترة الوجيهة و نحمده كثيرا لوصولنا إلى هذه المرتبة من العلم ، ولا ننسى الشكر الجزيل لمنارة العلم الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام .

نتقدم بالشكر والعرفان لاستاذنا الفاضل "غمام عمارة الجيلاني" الذي اشرف على هذا البحث ولم يبخل علينا بنصائحه و توجيهاته ، أدامه الله ذخرا لطلاب العلم راجين من المولى عز وجل ان يرفعه بالعلم درجات .

نتوجه بشكريا الخاص إلى الأستاذ "عوج حسن" على المجهود الذي بذله معنا وعلى النصائح و التوجيهات التي يسرت لنا الكثير من الصعاب .

كما نتقدم بالشكر و العرفان للدكتور خراز خالد و الاستاذة بن قدور منية بصفتها رئيسة و الاستاذ بالحبيب عبد الحميد بصفته مناقشا

كما نتقدم بالشكر إلى أساتذتنا الكرام الذين اشرفوا على تعليمنا طيلة مشوارنا الدراسي .

وفي الأخير نشكر كل من أسدى إلينا معروفا ولو من باب التشجيع ، واسأل الله أن يجازيكم عنا خير الجزاء .

الإهداء

وصلت رحلتي الجامعية الى نهايتها بعد تعب ومشقة ...

وها أنا اختتم بحث تخرجي بكل همّة ونشاط وأمتن لكل من كان له الفضل في مسيرتي

ومن ساعدني ولو باليسير

الى صاحب السيرة العطرة و الفكر المستنير الذي كان له الفضل في بلوغي التعليم العالي

(ابي الغالي) اطل الله في عمرة

الى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها الى ينبوع الصبر و التفائل (امي

الحبيبة) حفزها الله ورعاها

الى من كان لهم بالغ الاثر في كثير من العقبات والصعاب (اخوتي)

الى من وقف بجواري وكان بمثابة العنود و السند في سبيل استكمال البحث (خطيبي)

الى من كانوا ملاذي وملجئي الى من تضاوت معهم احلى اللحظات (صديقاتي)

اهدي لكم بحث تخرجي

صفاء بيكي

الإهداء

الى من بسمتها غايتي وما تحت اقدامها جنتي

الى كل من امدوني ببصيص امل وحفنة حب

الى من جرو عني الصبر وبالحكمة الهموني

الى القلوب الكبيرة التي يورقها قلقي و يسعدها فرحي

الى من نثرو الورد في دربي

الى من علموني كيف ابحر فلا اجد الامان الا على شوائطهم

الى من جمعنتي بهم الذكريات الجميلة و دفء الطفولة و الصبا

الى تلك القلوب الدافئة التي الهمنتني و بالامل غذنتني

الى براعم الحياة -اويس - تاج الدين - سراج الدين - ايلين - اباد

اهدي لكم رسالة تخرجني

صفاء زكور فرحات

الإهداء

الى من غمرتني بالحب والحنان و علمتني ان ارتقي سلم الحياة بحكمة وصبرامي

الى من شرفني احمل اسمه ابي رحمه الله

الى السند و العضد و الساعد اخوتي

الى براعم الحب و الحياة اسلام و ريتال

الى من شجعني في رحلتي الى التميز و النجاح جميع رفيقاتي

الى من كانوا رسلا للعلم و الاخلاق اساتذتي

والى كل من احبهم

اهدي لهم رسالتي

المخلص

اجري هذا البحث تحت ظروف مخبرية بكلية علوم الطبيعة و الحياة جامعة الشهيد حمه لخضر خلال العام الدراسي 2021/2020 بهدف دراسة تاثير الجبريلين GA3 على صنفين من نبات الكينوا (*Chenopodium quinoa willd*) (Q18)V4 و (Q27)V7 تحت تراكيز متزايدة من NaCl (S0=0, S1=200 , S2=400 , S3=600) mmol / l (S4=800 , S5=1000 وذلك خلال مرحلة الانبات، حيث عوملت هذه الاصناف بالجبريلين نقعا بغرض التقليل من التاثيرات السلبية للملوحة .

أكدت النتائج التي تحصلنا عليها تأثير الإجهاد الملحي على انبات بذور الكينوا مع اختلاف استجابة الصنفين للملوحة، وذلك من خلال نتائج بعض المعايير المدروسة لعملية الإنبات مثل: نسبة الإنبات، سرعة الانبات مؤشر توتر الإنبات، مؤشر توتر المادة الجافة، مؤشر توتر الملوحة، طول البادرات، الوزن الجاف و الطري. حيث أبدت هذه الدراسة نتائج أكثر ايجابية عند الصنف V7 (Q27) مقارنة بالصنف (Q18)V4 وعليه يمكننا اعتبار الصنف (Q27) أكثر مقاومة للإجهاد الملحي.

بينت النتائج المتحصل عليها ان NaCl يخفض إنبات بذور الكينوا كما ساعد استعمال الهرمون النباتي الجبريلين GA3 على زيادة مقاومة نبات الكينوا للإجهاد.

الكلمات المفتاحية : نبات الكينوا (*Chenopodium quinoa willd*) الاجهاد الملحي ، الجبريلين GA3، النقع، الانبات.

Summary

Summary

This research was conducted under laboratory conditions at the Faculty of Natural and Life Sciences, University of Hamma Lakhdar - El-Oued during the academic year 2020/2021 in order to study the effect of gibberellin GA3 on two cultivars of quinoa (*Chenopodium quinoa willd*) V4(Q18) and V7(Q27) under increasing concentrations of NaCl (S0= 0, S1=200, S2=400, S3=600, S4=800, S5=1000) mmol/l during the germination stage, where these cultivars were treated with gibberellin soaking in order to reduce the negative effects of salinity.

The results we obtained confirmed the effect of salt stress on the germination of quinoa seeds with the different response of the two cultivars to salinity, through the results of some studied criteria for the germination process such as: germination percentage, germination speed, germination stress index, dry matter tension index, salinity tension index, seedling length, weight. Dry and soft. This study showed more positive results for the variety V7 (Q27) compared to the variety V4 (Q18), and therefore we can consider the variety (Q27) more resistant to salt stress.

The obtained results showed that NaCl reduces the germination of quinoa seeds, and the use of the phytohormone gibberellin GA3 helped to increase the resistance of the quinoa plant to stress.

Key words: quinoa plant (*Chenopodium quinoa willd*), salt stress, gibberellin GA3, soaking, germination)

فهرس المحتويات

تشكرات

الإهداء

الملخص

فهرس المحتويات

فهرس الوثائق

فهرس الجداول

قائمة المختصرات

المقدمة

الجزء النظري

الفصل الأول: عموميات حول نبات الكينوا

- 1-تعريف العائلة الرمرامية:.....7
- 2-تعريف الكينوا :.....7
- 3-الأسماء الشائعة لنبات الكينوا :.....9
4. التصنيف العلمي للكينوا :.....10
- 5-الأصل والتوزيع الجغرافي للكينوا :.....11
- 6-الوصف النباتي :.....12
- 7-أصناف الكينوا :.....12

- 131-7- الكينوا من مناطق تقع عند مستوى سطح البحر:
- 132-7- الكينوا من الوديان الجافة والرطبة:
- 143-7- الكينوا من المناطق المدارية:
- 144-7- الكينوا من الصحراء:
- 145-7- الكينوا من المرتفعات:
- 158- الخصائص المورفولوجي لنبات الكينوا:
- 151-8- الجذر:
- 162-8- الساق:
- 173-8- الأوراق:
- 174-8- الزهرة:
- 185-8- الثمار:
- 199- استخدامات الكينوا:
- 191-9- غذاء الانسان:
- 202-9- اعلاف الحيوانات:
- 203-9- الصحية و الدوائية:
- 204-9- الصناعية:
- 2010- الاحتياجات البيئية للكينوا:
- 2111- القيمة الغذائية للكينوا:

22	:دورة حياة الكينوا
24	:مواعيد الزراعة
24	:امراض الكينوا

الفصل الثاني: الهرمونات النباتية

26	(هرمون الجبريلين GA3)
27	:1- الهرمونات النباتية
27	:1-1- تعريف الهرمونات النباتية
27	:1-2- خصائص الهرمونات النباتية
27	:1-3- اقسام منظمات النمو
28	:1-4- انواع الهرمونات النباتية
30	:2-هرمون الجبريلين
30	:2-1- تعريفه
30	:2-2- اكتشافه
31	:2-3- التركيب الكيميائي
32	:2-4- مكان تخليقه
33	:2-5- التأثيرات الفسيولوجية للجبرلينات
35	:2-6- تاثير الجبريلين على الانبات
35	:2-7- تاثير الجبريلين على الملوحة

36 2-8- علاقة حمض الجبريلين (GA3) بالعمليات الميتابوليزمية :

الفصل الثالث: الإنبات

38 1- تعريف الانبات :

38 2- مراحل الانبات :

39 3- انواع الانبات :

40 4- العوامل البيئية التي تؤثر على انبات البذور :

الفصل الرابع: الملوحة والإجهاد الملحي

43 1- تعريف الملوحة :

43 2- تعريف الاجهاد الملحي :

44 3- تاثير الاجهاد الملحي على عملية الانبات :

44 4- اقسام النباتات :

45 4-4- نباتات شديدة المقاومة :

45 5- تاثير الملوحة على مرفولوجية النبات :

45 5-1- على مستوى الجذور:

45 5-2- على مستوى السيقان:

45 5-3- على مستوى الأوراق:

46 6- استجابة النباتات للملوحة:

46 6-1- التحمل والحساسية:

46	:2-6-التأقلم:
47	:3-6-المقاومة:
49	:7-أثر الملوحة على المؤشرات الوظيفية للنبات:
49	:1-7-أثر الملوحة على تراكم البرولين:
49	:2-7-أثر الملوحة على تراكم السكريات :
50	:3-7-أثر الملوحة على الصبغات الخضراء:
50	:4-7-أثر الملوحة على عملية النتح:
50	:5-7-أثر الملوحة على الغشاء الخلوي:

الجزء العملي

الفصل الاول: المواد وطرق العمل

53	:1-الهدف من الدراسة :
53	:2-المواد المستعملة :
54	:3-طريقة الدراسة :
55	:1-3-تحضير محاليل السقي :
57	:2-3- عملية الزرع :
61	:3-3-جمع العينات :
61	:4-قياس الاوزان :
61	:1-4-الوزن الطري :

62 2-4- الوزن الجاف:

62 5-المعايير المدروسة :

الفصل الثاني: النتائج والمناقشة

66 1- النتائج :

66 1-1-دراسة تأثير الملوحة :

71 1-2-دراسة تأثير الاصناف :

74 1-3-دراسة تأثير الهرمون :

76 1-4-دراسة تأثير التداخل بين الملوحة و الهرمون :

79 1-5-دراسة تأثير التداخل بين الملوحة و الاصناف:

85 1-6-دراسة تأثير التداخل بين الاصناف و الهرمونات :

88 1-7-دراسة تأثير التداخل بين الهرمون و الملوحة و الاصناف :

93 1-8-معدل طول البادرة:

95 1-9-الوزن الطري :

97 1-10-الوزن الجاف :

101..... 2-المناقشة.....

104.....الخاتمة.....

106.....قائمة المراجع.....

118.....الملاحق.....

فهرس الوثائق

الصفحة	عنوان الوثيقة
8	الوثيقة(1): صورة لنبات الكينوا (FAO;2013)
12	الوثيقة (2) : صورة لنبته الكينوا (-http//www.institut kloran- (org/botanique/herbiers
13	الوثيقة(3) : صورة توضح اصناف بذور الكينوا (الشثري; 2018)
15	الوثيقة (4) : صورة توضح اصناف الكينوا (Adeline jadenne ;2014)
16	الوثيقة (5) : صورة تمثل النظام الجذري للكينوا (Gandarillas;1979)
17	الوثيقة (6) : صورة توضح تباين عدد الأسنان في أوراق نبات الكينوا (Gandarillas; 1979)
18	الوثيقة (7) : صورة للزهرة المتكتلة و القطفية (Gandarillas; 1979)
24	الوثيقة (8) : صورة لمحصول الكينوا (خطاب ; 2015)
32	الوثيقة (9) : صورة توضح التركيب الكيميائي للجبريلين
38	الوثيقة (10) : صورة توضح انبات بذور الكينوا
54	الوثيقة (11) : صور توضح عملية تعقيم بذور الكينوا و تصفيتها
55	الوثيقة (12) : صورة توضح عملية نقع البذور في GA والماء المقطر
57	الوثيقة (13) : صور توضح عملية تحضير محاليل السقي
60	الوثيقة (14) : صور توضح عملية زرع البذور للصنفين
62	الوثيقة (15) : صور توضح مراحل عملية قياس الوزن الجاف لنبات الكينوا

93	الوثيقة (16): تبين نتائج تأثير الملوحة على صفة معدل طول البادرة عند الصنف Q18 (V4) في وجود وغياب هرمون الجبريلين
94	الوثيقة (17): تبين نتائج تأثير الملوحة على صفة طول البادرات للصنف V7
95	الوثيقة (18): تبين نتائج تأثير الملوحة على الوزن الطري للصنف Q18 في وجود وغياب هرمون الجبريلين
96	الوثيقة (19) : تبين النتائج تأثير الملوحة على الوزن الطري عند الصنف v7 (Q27) في وجود وغياب هرمون الجبريلين
97	الوثيقة (20) : تبين نتائج تأثير الملوحة على الوزن الجاف للصنف (V4) Q18
99	الوثيقة (21) : تبين نتائج تأثير الملوحة على الوزن الجاف للصنف Q27 (V7) في وجود وغياب هرمون الجبريلين

فهرس الجداول

الصفحة	عنوان الجدول
9	الجدول(1): الاسماء الشائعة لنبات الكينوا
10	الجدول(2): التصنيف العلمي للكينوا (Herbillon M; 2015)
22	الجدول (3) : القيمة الغذائية للكينوا
23	الجدول (4) : دورة حياة الكينوا
28	الجدول(5) :اهم عائلات الهرمونات النباتية و بعض الوظائف الفسيولوجية (Hopkins; 2003)
56	الجدول (6) : يبين تحضير محاليل السقي
58	جدول(7): معاملات الصنف الاول لبذور الكينوا (V4)
59	جدول (8) : معاملات الصنف الثاني للكينوا (V7)
66	جدول (9):الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على نسبة الانبات
67	جدول (10): الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على سرعة الانبات
68	جدول (11):الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على قوة نشاط البذور
69	جدول (12): الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على مؤشر توتر الانبات
70	جدول(13): الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على مؤشر توتر المادة
71	جدول (14): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الملوحة على مؤشر توتر
71	جدول (15): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الأصناف على نسبة الانبات
72	جدول (16): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الأصناف على سرعة الإنبات

72	جدول (17): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الاصناف على قوة نشاط البذور
73	جدول (18): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الاصناف على مؤشر توتر الانبات
73	جدول (19): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الاصناف على مؤشر توتر المادة الجافة
74	جدول (20): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الاصناف على مؤشر توتر الملوحة
74	جدول (21): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الهرمون على نسبة الانبات
75	جدول (22): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الهرمون على سرعة الانبات
75	جدول (23): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الهرمون على قوة نشاط البذور
77	جدول (24): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والهرمون على نسبة الانبات
78	جدول (25): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الهرمون و الملوحة على سرعة الانبات
79	جدول (26): الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الهرمون و الملوحة على قوة نشاط البذور
80	جدول (27): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على نسبة الانبات
81	جدول (28): الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على سرعة الانبات

82	جدول(29) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على قوة نشاط البذور
83	جدول(30) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على مؤشر توتر الانبات
84	جدول(31) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على مؤشر توتر المادة الجافة
85	جدول(32) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على مؤشر توتر المادة الملوحة
86	جدول(33) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمونات على نسبة الانبات
87	جدول(34) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمونات على سرعة الانبات
87	جدول(35) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمونات على قوة نشاط البذور
88	جدول(36) : الفروقات المعنوية للمجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمون و الملوحة على نسبة الانبات
90	جدول(37) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمون و الملوحة على سرعة الانبات
91	جدول(38) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمون و الملوحة على قوة نشاط البذور

قائمة المختصرات

GA3: هرمون الجبريلين

V4: الصنف الاول للكينوا (Q18)

V7: الصنف الثاني للكينوا (Q27)

NaCl: كلوريد الصوديوم

FAO: المنظمة العالمية للاغذية و الزراعة

S0 S1 S2 S3 S4 S5 : مستويات الملوحة

R1 R2 R3: التكرارات

GP : نسبة الانبات

GR :سرعة الانبات

GSI : مؤشر توتر الانبات

DMSI : مؤشر توتر المادة الجافة

STI : مؤشر توتر الملوحة

SV : قوة نشاط البذور

المقدمة

المقدمة

تعد الزراعة القاعدة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي لأهميتها في انتاج المحاصيل الزراعية لسد حاجيات السكان الاستهلاكية الغذائية، اذ يشهد العالم ضغطا متزايدا على الغذاء ويعاني اكثر من 500 مليون نسمة من نقص الغذاء باستمرار (صفية;2015). ولتوفير الأمن الغذائي وجب البحث عن محاصيل بديلة تسد النقص الغذائي، ومن ابرز هذه المحاصيل الكينوا التي تعتبر محصولا بديلا رئيسيا لسد النقص الغذائي في هذا القرن (Touati ;2018).

تعتبر جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية الموطن الأصلي لمحصول الكينوا(2006; Matiacevich et al). حيث بينت الأدلة ان الكينوا كانت تزرع قبل 5000 سنة على نطاق واسع في كولومبيا، البيرو، بوليفيا وتشيلي كونها واحدة من محاصيل الحبوب الرئيسية ذات القيمة الغذائية العالية، ولهذا فإن الكينوا قد تلعب دورا رئيسيا في توفير الغذاء بالمستقبل (FAO ;1998). ونظرا لقيمتها الغذائية والاقتصادية العالية ودورها في القضاء على الفقر انعقد مؤتمر دولي نظمه منظمة الزراعة والاغذية للأمم المتحدة FAO حول الكينوا تحت شعار "مستقبل زرعت بذوره قبل آلاف السنين". تحظى الكينوا باهتمام بالغ بصفتها أحد المحاصيل الزراعية متعددة الاستخدام، وتزرع في ظروف مناخية قاسية للغاية من حيث التربة والمناخ ويمتاز بقدرات تحمل هائلة (خطاب ; 2015) ، مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان وزيادة الطلب على الغذاء الزراعي برزت مشكلة الملوحة كإحدى المشاكل الرئيسية التي تقف كعقبة أمام زيادة الإنتاج الزراعي لما تسببه من تأثيرات سلبية مباشرة(سمية و اسموزية) على النبات فضلا عن اختلال توازن العناصر الغذائية و تأثيرات غير مباشرة على الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة (الزبيدي; 1989)، وإن آلية التحمل الملحي في النباتات غير الملحية(Glycophytes) يتم اما بالقدرة على تجنب امتصاص الأملاح أو امتلاكها آلية معينة مرتبطة بقدرتها على التخلص من أيونات الصوديوم والكلوريد الممتصة مع المحافظة على نسبة عالية من أيونات البوتاسيوم في الأوراق، ومن آليات

تحمل الملوحة الأخرى هي القدرة على التنظيم الازموزي Osmoregulation حيث يحافظ هذا التنظيم على انتفاخ الخلايا وزيادة العصير الخلوي بدرجة تكفي لمقاومة الجهد الأزموزي الخارجي وبقاء النبات على جهد مائي مرتفع (أكثر سالبية) ليتسنى له إمتصاص الماء من التربة بكفاءة أفضل (الشهواني; 2006).

من الطرق المتبعة لتقليل تأثيرات الملوحة على النبات هو المعاملة بالهرمونات النباتية (الشحات; 1990) و (Bultyck et Lambers; 2004)، اذ تسبب الملوحة اضطراب تراكيز الهرمونات في النبات بزيادة مثبطات النمو مثل الإيثلين وحامض الإبيسيسيك وانخفاض تراكيز مشجعات النمو مثل الجبريلينات والأوكسينات في الأوراق وبقية أجزاء النبات (Torres-Garcia et al; 2009) ، كما يهدف استخدام هرمون الجبريلين GA3 في الظروف الملحية للتغلب على فعالية تثبيط الملوحة العالية لانبات البذور و النمو مما يؤدي الى رفع كفاءة حيوية النباتات فتنمو حتى في الظروف الملحية دون حدوث أي ضرر (الشحات; 1999) .

ومن أجل هذا جاءت دراستنا لهذا الموضوع في محاولة معرفة مدى تاثير النقع بمنظم النمو GA3 على خصائص انبات بعض اصناف الكينوا النامية في وسط ملحي .

حيث احتوت دراستنا على جزئين:

• جزء نظري و يحوي أربع فصول:

- الفصل الأول: عموميات حول نبات الكينوا

- الفصل الثاني : الهرمونات النباتية (هرمون الجبريلين GA3)

- الفصل الثالث: الإنبات

- الفصل الرابع: الملوحة والإجهاد الملحي

• جزء تطبيقي ويحوي فصلين:

- الفصل الأول: المواد وطرق العمل

- الفصل الثاني: النتائج والمناقشة

وأخيراً أنهينا المذكرة بخلاصة عامة تم فيها تلخيص مجمل النتائج العملية المتحصل عليها.

الجزء النظري

الفصل الأول

عموميات حول نبات الكينوا

1-تعريف العائلة الرمرامية:

العائلة الرمرامية *chenopodiacea* هي عائلة نباتية من الفصيلة القطيفة تضم الشمندر و السبانخ، وهي تضم نحو 100 جنس و1400 نوع منتشرة في جميع أنحاء العالم وخاصة في المناطق الجافة و الملحية، كما أن نباتاتها تتواجد في بيئات قريبة من ساحل البحر وتعرف هذه الفصيلة أيضا باسم الفصيلة السرمقية. توجد أفراد هذه الفصيلة في المناطق القاحلة و الصحراوية إضافة إلى ذلك المناطق المالحة و الساحلية لشمال و جنوب إفريقيا و آسيا و استراليا، أوروبا وأمريكا الشمالية و الجنوبية (Herbset et al ;1980) .

معظم نباتات هذه الفصيلة أعشاب حولية أو معمرة و تكون شجيراتها طويلة نوعا ما (خطاف; 2011) كما تكون جذورها وتدية ذات امتدادات عميقة في التربة و أوراقها بسيطة متبادلة غالبا ما تكون غضة عديمة الاذينات، أما أزهارها فتكون صغيرة الحجم ومنتظمة وحيدة أو ثنائية الجنس، تتجمع في نورات غير واضحة تشبه السنبله أو في نورات محدودة . أما بالنسبة للغلاف الزهري فيكون بسيط مكون من خمس بتلات منفصلة أو ملتحمة القواعد، والطلع يكون خماسي الاسدية حيث تتوضع عادة بشكل حر مقابل للبتلات، والمدقة مكونة من كربلتين أو ثلاث كرابل ذات مبيض علوي أو محيطي احيانا وهو وحيد المسكن ذو وضع مشيمي قاعدي أو جداري (شنقارة و العايش; 2018).

2-تعريف الكينوا :

تتبع الكينوا *quinoa chenopodium wild* جنس السرمق (*Chenopodium*) الذي ينتمي للعائلة الرمرامية *chenopodiacea* (Valencia,2013) و تعرف ايضا ب petty rice في انجلترا موطنها الاصلي منطقة جبال الانديز في امريكا الجنوبية (Matiacevich et al; 2006) وهو نبات عشبي حولي و ذاتي التلقيح (ربيع و جويل; 2015) وتنمو هذه البذور في امريكا الجنوبية، وقد بدأت في الانتشار باماكن اخرى من العالم، كما تحتوي

الكينوا على جميع الاحماض الامينية الضرورية و بالتالي فانها تعد بروتينا نباتيا كاملا (عبد الله; 2018) .

الوثيقة(1): صورة لنبات الكينوا (FAO;2013)

3-الأسماء الشائعة لنبات الكينوا :

الجدول(1): الاسماء الشائعة لنبات الكينوا(Edif ;2013)

الدول	الاسم الشائع
الكيشوا	Kiuna, quinua, Parca
الأيمارا	Supha,jopa,jupha,jauira, aara, ccallap, vocali
أزتيك	Huatzontle
تشيشا	Suba, supha, pasca
مابوتشي	Quinua
اسبانيا	Quinua, quinoa, quingua, quiuna, kinoa, trigo inca, arrocill, Dahui, juba, ,triguillo ubiquo, arroz del Peru, ubate, jaira, suba
الهند	Bathu
البرتغال	Arroz miu'do do peru', espinafre do peru' quinoa
انجلترا	Quinoa, quinua, kinoa, sweet quinoa, peruvian rice, Inca rice, petty rice
فرنسا	Anserine quinoa, riz de Pérou, petit riz de Pérou
إيطاليا	Quinua, Chinua
المانيا	Reisspinat,Peruanischerreisspina, reismelde, Reis-gerwacks, Inkaweizen

4. التصنيف العلمي للكينوا :

تعتبر الكينوا نبات عشبي ذات بذور صغيرة الحجم (1.5- 2 مم) وصنفت في العائلة الرمرامية chenopodiaceae حسب (Cronquist;1981) ومنذ 2009 صنفت من جديد حسب التصنيف الفيلوجينيستيكي (APG III) في العائلة Amaranthaceae كما يلي:

الجدول(2): التصنيف العلمي للكينوا (Herbillon M; 2015)

Classification de croquist 1981	
Régne	Plantae
Division	Magnoliophyta
Classe	Magnoliopsidae
Sous-classe	Caryophyllidae
Ordre	Caryophyllales
Famille	Chenopodiaceae
Genre	Chenopodium
Classification APG III 2009	
Ordre	Caryophyllales
Famille	Amaranthaceae
Nom binomial	
<i>Chenopodium quinoa Willd . 1798</i>	

5-الأصل والتوزيع الجغرافي للكينوا :

الكينوا هي نبات عشبي سنوي ينشا في منطقة " الانديز " في امريكا الجنوبية وبشكل أدق حول بحيرة "تيتيكاكا" مزروعة على ارتفاع 400 متر من مستوى سطح البحر (Herbillon; 2015).

تعتبر بذور الكينوا حاليا حبوب زائفة، وفقا للروايات التاريخية تم تدجين "الكينوا " منذ اكثر من 700 سنة مضت من قبل شعوب "الانديز" وتم العثور على اقدم بقايا الكينوا في اياكاتشوا في البيرو ويرجع تاريخها الى 300 سنة قبل الميلاد وفي نهاية الاثار تم اكتشافها في بوليفيا والتي ترجع الى 700 سنة قبل الميلاد (Galaway et al; 1990)(Herbillon; 2015).

لم يرى المستعمرون الاسبان الذين وصلو إلى هذه المناطق في بداية القرن 16 م أن هذه الثقافات تستحق الاهتمام، ومنه لم يكن مناسباً بالنسبة إليهم ان يتكبدوا عناء حمل بعض القناطرير في الحجز من سفنهم العملاقة. في حين ان أحفاد "الانكا " استمروا في زراعة الكينوا عبر القرون .ظلت الكينوا غير معروفة تماما في القارة القديمة حتى وقت قريب عندما اكتشفت خصائصه وقيمه الغذائية المميزة والغير معروفة تماما (Benoit; 2013).

وفقا لفاند وينكل (2015) ظهرت ثقافة "الكينوا" في اوروبا في بداية سنة 2000 م. واثر ذلك تم اجراء العديد من التجارب مع مراكز الابحاث لتكييف اختيار البذور مع التربة و الظروف المناخية المناسبة لها في اوروبا نجد ان "كينوا" حاليا في بعض الدول مثل : فرنسا وبريطانيا و المانيا وهولندا (Hadjje; 2019).

6- الوصف النباتي :

الكينوا نبات حولي يصل طوله (1 - 1.5 متر) وقد يكون اكثر و النبات له ساق سميك قائم متفرع أو غير متفرع ذو اوراق متبادلة، و اوراق تشبه اوراق السبانخ و يحمل الحبوب في شمرايح في قمم الافرع تشبه الذره الرفيعة اما البذور فتكون صغيرة الحجم قطرها (3مم) و الاوراق ذات الوان مختلفة كالأبيض و الاخضر و الاحمر و الازرق و البنفسجي و الاسود و هذا اللون له ارتباط وثيق بنسبة مادة الصابونين التي تصل (من 2 الى 6%) (وليد; 2016).

الوثيقة (2) : صورة لنبته الكينوا (<http://www.institut.kloran->)

(org/botanique/herbiers)

7- أصناف الكينوا :

أخذت التصنيفات الأولى للكينوا بالاعتماد على لون النبات و البذور (سوداء ، حمراء ،بيضاء) و احيانا يعتمد على شكل و طعم البذور (Tapia et al;1979) وهناك اكثر من

6000 صنف من الكينوا المزروعة و البرية يمكن تصنيفها في خمس فئات أساسية و وفقا لتكيفها مع الظروف الايكولوجية الزراعية مبينة كما يلي :

الوثيقة(3) : صورة توضح اصناف بذور الكينوا (الشثري; 2018)

1-7- الكينوا من مناطق تقع عند مستوى سطح البحر:

تأتي من جنوب التشيلي حول خط عرض 30 درجة جنوبا خاصة في منطقة فيلادلفيا وتنمو في المناطق الواقعة بين مستوى البحر و 500 متر فوق مستوى سطح البحر، ويتراوح معدل هطول الامطار من (800 الى 1500) ملم في السنة (Gacobsen et Stolen ;1993) ويكون ارتفاعها من (1 الى 1.4) متر معظمها غير متفرعة وتنتج بذور صغيرة مسطحة و صفراء وتكون شفافة و غنية بالصابونين (Herbillon ;2015).

2-7-الكينوا من الوديان الجافة والرطبة:

تاتي من وديان الانديز (الوديان في جنوب كولومبيا و الاكوادور و البيرو اضافة الى ذلك بوليفيا) وتقع على ارتفاع (2000 الى 3500) متر، ويتراوح معدل هطول الامطار السنوي من (700 الى 1500) ملم (Gandarillas;1979). وتكون طويلة بعضها يصل الى 3.5 متر وهي مناسبة لدرجات حرارة تتراوح بين (10 و 18) درجة مئوية وهي غير

مقاومة للتجمد وتكون معظمها متفرعة وتنتج حبيبات صغيرة تحتوي على كمية قليلة من الصابونين (Herbillon ;2015).

3-7- الكينوا من المناطق المدارية:

هذه السلالة تنمو على ارتفاع يتراوح بين (1500 و 2000) متر في المنطقة الزراعية البيئية يونجا بوليفياو (Group credit agricole de Maroc ;2014) يسمح تكيفها مع المناخ الشبه استوائي لها بمقاومة مستويات اعلى من الامطار و الحرارة، ويتراوح معدل هطول الامطار من (1000 الى 2000) ملم في السنة (Montoya et autre ;2005). وتكون نباتاتها داكنة اللون و تاخذ جذوعها اللون البرتقالي في الحالة الناضجة، وتكون البذور صغيرة بيضاء أو برتقالية، ولديها موسم نمو طويل حوالي 200 يوم (Herbillon; 2015).

4-7- الكينوا من الصحراء :

هذه المجموعة من الكينوا تقاوم الظروف القاسية (Group credit agricole de Maroc;2014). تأتي من الصحاري الشاسعة الملحية في جنوب التيبيلانو البوليفي بونا شمال التشيلي وشمال شرق الارجننتين، وتقع على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر ويتراوح معدل هطول الامطار من (250- 400) ملم في السنة (Carmen et al ;2008) ويمكن لنباتاتها ان تتحمل الظروف القاسية (درجة الحرارة من 8 درجة مئوية، والتربة القلوية حتى 8 درجة حموضة كما انها تتحمل الملوحة العالية) وتكون بذورها كبيرة مع نسبة عالية من الصابونين (Herbillon;2015).

5-7- الكينوا من المرتفعات :

تزرع هذه الاصناف في الظروف المناخية التي تتميز بقلّة سقوط الامطار ودرجات الحرارة الملائمة (Group credit agricole de Maroc ;2014) ويتراوح معدل هطول

الامطار السنوي من (400 - 800) ملم في السنة (Carmen et al ;2008) ، كما تأتي من المناطق الجبلية حول بحيرة تيتيكاكا حيث ظروف النمو المتغيرة و تتكيف مع السهول المرتفعة بين (3800 و 4100) متر و تكون نباتاتها صغير تتراوح بين (0.5 و 1.5) متر مع سيقان مستقيمة ولها فترة نمو قصيرة (Herbillon; 2015).

الوثيقة (4) : صورة توضح اصناف الكينوا (Adeline Gadenne ;2014)

8-الخصائص المورفولوجية لنبات الكينوا :

ثم وصف أربعة أنواع من الكينوا *Chenopodium album* تتميز ببذور حلوة *Chenopodium pallidus* أو ذات بذور مرة *Chenopodium ruber* او قد تكون ذات بذور حمراء، *Chenopodium niger* او سوداء و من خلال الخصائص المورفولوجية التي تم تصنيفها وفقا للمعايير التصنيفية، فقد اتفق علماء النبات الذين درسوا تصنيف الكينوا على أنه يمكن اعتباره نوعا فريدا من الأنواع داخل جنس. (Tapia et al; 1979).

8-1-الجذر:

المجموع الجذري للكينوا محوري قوي و عميق كما انه ليفي و متفرع الى حد ما، وهو ما يساعدها على مقاومة الجفاف و يوفر للنبتة الثبات اللازم (Mujica et al; 2001) و

الجذر الرئيسي سهل التمييز عن الجذور الثانوية وعلى الرغم من ان مظهره يشبه الكتلة المتشابكة، و اول ما ينمو عند الانبات الجذير الذي يستمر في النمو حتى يشكل الجذر وفي حالات الجفاف يمكن ان يصل عمقه الى 180 سم، مع ظهور جذور جانبية وتظهر الجذيرات أو الشعيرات الجذرية، كما يتفاوت عمق الجذر و التفرعات و توزيع الجذيرات تبعا للتركيب الوراثي (Jacobsen et Stolen; 1993)

الوثيقة (5) : صورة تمثل النظام الجذري للكينوا (Gandarillas;1979)

ان النظام الجذري هذا قوي جدا، ويمكنه دعم النباتات التي يزيد ارتفاعها عن 2 م (Mujica et al;2001) كما يرتبط عمق الجذر ارتباطا وثيقا بارتفاع النبات، و قد تم الاشارة الى نباتات يبلغ ارتفاعها 1.70 م مع جذر 1.50م وأخرى بارتفاع 90 سم مع جذر 80 سم (Pacheco et Morlon ;1978).

2-8-الساق :

الساق هو اسطواني على مستوى العنق، يتراوح قطره بين (1 و8) سم، وارتفاعه بين 50 سم و2 وفقا (Mujica et a; 2001).لونه متغير جدا، يمكن أن يكون أخضر بشكل موحد أو أخضر مع خطوط أرجوانية أو حمراء، أو أحمر بشكل موحد (Gandarillas;1979) ،يوجد في داخله نخاع يتحلل عند النضج مخلفا فراغا جافا اسفنجيا

غنيا بالبكتين و السيليلوز و يتفاوت قطر الساق تبعا للتركيب الوراثي وقرب البذور من بعضها عند الزراعة و التسميد. (Gandarillas;1979)

3-8-الأوراق :

تكون الاوراق متبادلة و تتألف من سويقات وأعناقها طويلة ورقيقة موزعة على الجانب العلوي، الأوراق السفلية كبيرة (12×15) سم معينة الشكل أو ثلاثي، في حين أن الأوراق العلوية صغيرة، حوالي (2×10) مم، سناني الشكل أو ثلاثي (Mujica et al ;2001). ويختلف لون الأوراق باختلاف الأنماط الوراثية، فهي عادة خضراء عندما تكون صغيرة ثم تتحول الى اللون الأصفر، احمر الأرجواني، هذه الألوان هي نتيجة وجود صبغات نباتية تسمى بيتالين (Gandarillas;1968).

الوثيقة (6) : صورة توضح تباين عدد الأسنان في أوراق نبات الكينوا (Gandarillas; 1979)

4-8-الزهرة :

أزهار الكينوا هي عبارة عن عنقود زهري يتكون من محور رئيسي يظهر منه محوران الثانوي والثالثي (Risi et Galwey; 1984) ، و يختلف طول العنقود الزهري حسب النوع و الظروف البيئية بحيث تتراوح الطول بين (30 و80) سم و قطرها من (5 إلى 30) سم، ويختلف أيضا في عدد تجمعات و يتراوح بين (30 الى 120) سم (2001) ;

(Mujica et al) . وتكون زهور الكينوا صغيرة عديمة البتلات اما ان تكون أنثى أو خنثى، يتراوح طول الزهرة بين (2 و 5) مم وتحتوي على 2 او 3 مياسم ريشية و 5 اسدية تظل مفتوحة لمدة 5 الى 7 ايام (Tapia et al; 1979) اما المبيض فهو اهليجي علوي وحيد الحجرة ، وتكون الازهار الخنثى الموجودة في الكبة قمية وتبرز بين المدقات (1984; Galwey et Risi).

كما يوجد نوعان من أزهار الكينوا (l'amaranthiformet , le glomerulaire) بحيث يعتبران من الأنواع الأكثر شيوعا كما موضحة في الصورة التالية:

الوثيقة (7) : صورة للزهرة المتكتلة و القطيفية (Gandarillas; 1979)

8-5- الثمار :

ثمرة الكينوا ثمرة فقيرة تستخرج من مبيض علوي وحيد الحجرة، وهي ذات تناظر ظهري بطني وشكلها اسطواني عديسي وهي اعرض قليلا صوب المركز، ويوجد على الجزء البطني للثمرة لطخة ناجمة عن اقحام الثمرة في كرسي الزهرة (Risi et Galwey ;1984) ويتجلى في الثمرة ثلاثة اجزاء

- الابيسيرم : يوجد فيها الصابونين الذي يمنح الحبوب طعما مرا، وفيها اربع طبقات طبقة خارجية خشنة وهشة ويمكن فركها بسهولة اما الطبقة الثانية فهي رقيقة جدا

وملساء وتكون الطبقة الثالثة صفراء اللون ورقيقة وغير شفافة، والطبقة الرابعة شفافة وتتكون من صف واحد من الخلايا.

- **الجنين** : يتكون من فلتين وجذير ويشكل 30% من الحجم الكلي للبذرة ، الذي يحيط بالمنطقة المحيطة بالجلد على شكل حلقة مع انحناء 320 درجة ويكون لونه اصفر، بقياس 3.54 ملم في الطول و 0.36 ملم في العرض.
- **البيريسبيريم** : وهي انسجة التخزين الرئيسية وتتكون بشكل اساسي من حبيبات النشاء، لونه ابيض ويمثل عمليا ويشكل في الواقع 60 % من سطح البذرة (Mujica et al ; 2001).

9-استخدامات الكينوا :

تعتبر بذور الكينوا من اهم المحاصيل الزراعية المستقبلية الواعدة التي حظيت باهمية كبيرة في هذه السنوات الاخيرة كما اكتسبت شعبية متنامية في الوقت الراهن، بحيث يمكن ان يقوم عليها عدد كبير من الصناعات الغذائية لما له من قيمة غذائية عالية وفائدة طبية وصحية كبيرة، كما تعددت استخداماتها ومن بين هذه الاستخدامات:

9-1-غذاء الانسان :

تعتبر الكينوا غذاءا صحيا بامتياز نظرا لغناء حبوبه بالمغذيات الطبيعية و الفيتامينات . فالكينوا غني بالألياف , الدهون الغير مشبعة و المعادن كالفسفور ,الكالسيوم ,الزنك ,المغنيسيوم و الحديد.ويحتوي نسبة عالية جدا من البروتين السهل الهضم و المكون من الأحماض الامينية الثماني الاساسة لنمو الأطفال و الكبار،و الجدير بالذكر ان الكينوا خالي من الغلوتين ومناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز في الحليب (قبلان و بريدي ; 2015).

كما تستخدم بذور الكينوا بشكل شائع كبديل للأرز، حيث تغلى البذور المعالجة وتقدم كأرز.

(Lamothe et al ; 2015) ; (Miaranda et al ;2011)

وفقا لـ (Valencia-Chamorro ; 2003) يمكن تقديم اوراق نبات الكينوا كسلطة نيئة أو مطبوخة مثل الخضار الاخرى .

2-9-اعلاف الحيوانات :

تستخدم النبتة كلها كعلف اخضر ، كما يتم استخدام مخلفات الحصاد لتغذية الابقار و الضان و الخنازير و الخيول و الطيور الداجنة (FAO; 2013).

3-9-الصحية و الدوائية :

تستخدم اوراق الكينوا و ساقها و حبوبها لاغراض دوائية .مداواة الجروح والحد من التورم و تخفيف الالم (الام الاسنان)وتطهير مجري البول كما تستخدم في تجبير العظام ومعالجة النزيف الداخلي و كطارد للحشرات (FAO; 2013).

• وفقا لـ (Rodriguez; 2015) تعد الكينوا بمثابة غذاء صحي لمرضى السكري والذين يعانون من الاضطرابات الهضمية .

4-9- الصناعية :

• يكون استعمالها مرتبط بمجموعة من المنتجات الثانوية للاغذية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الدوائية ... الخ (Group credit agricole du Maroc; 2014)
• يحتوي مسحوق البذور على مادة الصابونين المستخدمة في صناعة الصابون والشامبو ومعجون الأسنان والمنظفات (Rojes et al; 2014).

10-الاحتياجات البيئية للكينوا :

يتطلب نبات الكينوا درجات الحرارة المنخفضة وعدد قليل من ساعات النهار حيث تعادل درجة الحرارة المثلى لنموه 20 درجة مئوية ، لذلك يعتبر هذا النبات كمحصول شتوي وربيعي . اما محصول الكينوا فهو حساس للحرارة في مرحلتين مهمتين :

1- مرحلة ما بعد الانبات : تموت نباتات الكينوا اذا انخفض معدل الحرارة دون الصفر بعد بزوغها وقبل بلوغها طور الست ورقات .

2- مرحلة الازهار : تدخل النباتات في طور السكون وعقم اذا تعدت الحرارة معدل 35 درجة مئوية ، كما تحتاج نباتات الكينوا الى فترة جفاف عند بلوغها طور الازهار وتكوين الحبوب .

أما بالنسبة للتربة فان التربة المناسبة لزراعة الكينوا هي الرملية الطينية ، كما يتحمل نبات الكينوا الملوحة بدرجة مرتفعة حيث يمكنه الإنبات والنمو وإنتاج البذور عند مستويات ملوحة تعادل ملوحة مياه البحر تقريبا (40 ديسيسيمنز / ميم أو 28000 جزء بالمليون) (حيريش ; 2018).

11-القيمة الغذائية للكينوا :

• بذور الكينوا تعتبر مصدر غني بالمعادن مثلا : البوتاسيوم ، الصوديوم ، الكالسيوم والحديد (karkanis et al.,2013) اما اوراقها فهي غنية بالبروتين ، الكاروتين ، حمض الاسكوربيك ، الفيتامينات خاصة فيتامين B و C والاحماض الامنية (koyro et Said; 2008) كما تتوفر على الفلافنويدات ، الاحماض الفينولية ، الصابونينات، كما تحتوي ايضا على كمية قليلة من الكالسيوم ، فيتامين ب3 ، فيتامين أي و اوميغا 3 (Valencia-Chamorro; 2004)

• القيمة الغذائية في 1 كوب معياري من الكينوا المطبوخة والتي تساوي 185 جرام موضحة في الجدول (3):

الجدول (3) : القيمة الغذائية للكينوا

سعرات حرارية	222 سعرة حرارية
كربوهيدرات (نشويات)	39 جرام
دهون	4 جرام
بروتين	8 جرام
الياف	5 جرام
منغنيز	58 % من الاحتياج اليومي
مغنيسيوم	30% من الاحتياج اليومي
فوسفور	28% من الاحتياج اليومي
الفولات	19% من الاحتياج اليومي
نحاس	18% من الاحتياج اليومي
حديد	15% من الاحتياج اليومي
زنك	13% من الاحتياج اليومي
بوتاسيوم	9% من الاحتياج اليومي
فيتامين ب1 ، ب2 ، ب6	اكثر من 10% من الاحتياج اليومي

12-دورة حياة الكينوا :

وفقا لمقياس (Mujica et Canahua; 1989) لتطوير النبات ، هناك 12 مرحلة موضحة

في الجدول حسب (Atiet-allah et Saidani; 2019) :

الجدول (4) : دورة حياة الكينوا

الأطوار	الأيام عند الزرع	الوصف
الإنبات	7الى 10	ترك الشتلات و نشر أوراق النبتة
ورقتان حقيقتان	15الى 20	بالتزامن مع نمو الجذر السريع
أربع أوراق حقيقية	25الى 30	تكون أوراق النبتة خضراء دائما تظهر الشتلات مقاومة جيدة للبرد و الجفاف
ست أوراق حقيقية	35الى 45	ظهور الزوج الثالث من الأوراق الحقيقية وتبدأ أوراق النبتة في الذبول
التفرع	45الى 50	وجود براعم الابطين ،تساقط اوراق النبتة ،مصفرة ،وتترك ندبة في الجذع
بداية تكوين الكأس	55الى 60	يبدا الازهار بالظهور في قمة النبات، يطيل القضيب ويزيد قطره
تكوين الكأس Panicle	65الى 70	يظهر الازهار بوضوح الان فوق الاوراق
بداية تشكل الأزهار	75الى 80	فتح الزهور الاولى .يبدا النبات في ان يكون اكثر حساسية للبرد و الجفاف
الإزهار	90او 100	فتح 50 % من ازهار النورات .تتساقط الاوراق السفلية .
الحبوب اللبنية	100الى 130	توصف الحبوب بالحليب .يؤدي نقص المياه الى انخفاض حاد في الغلة
خزن الحبة	130الى 160	يصبح الجزء الداخلي من الفاكهة قواما فطريا
النضج الفسيولوجي	160الى 180	حبة اكثر مقاومة للضغط تحولت معظم الاوراق الى اللون الاصفر و سقطت

13-مواعيد الزراعة:

يعتبر شهر نوفمبر افضل وقت لبدء زراعة الكينوا و تزرع بكثافة نباتية قدرها 100-120 الف نبات /فدان ويعيش في الارض من 90-120 يوما و يتم الحصاد في منتصف افريل حتى ماي (وليد ; 2016) .

الوثيقة (8) : صورة لمحصول الكينوا (خطاب ; 2015)

14-امراض الكينوا :

للكينوا مجموعة كبيرة من مسببات الامراض و الافات التي تهاجمها وتسبب لها اضرار كبيرة باضافة الى ذلك تهاجم الطيور الكينوا بشكل رئيسي في مرحلة الازهار ، لكنها تسبب ضرر طفيفا لان الكينوا لديها دفاع كيميائي على شكل صابونين يمنح مقاومة للحشرات الضارة و الطيور فالمحتوى العالي من الصابونين للبذور في يجعلها اقل عرضة للهجومو ذلك بفضل مذاقه المر و سميته (Sophie;2015) . كما تتعرض يرقات العثة (night moth noctuelles) لنبته الكينوا في مراحلها الاولى (من ورقتين الى ست ورقات) فتحدث فيها ثقب ، بالاضافة الى حشرة المن (aphid) و نطاط الورق (leafhopper) و حشرة السونة (eurygaster) ، اما الامراض الاخرى الاكثر شيوعا على الكينوا فهي البياض الزغبي (peronospora) والتبقع الورقي (ascochyta hyalospora)

(قبلان و بريدي;2015) و العفن الفطري و هناك امراض ثانوية اخرى و هي بقع الاوراق و العفن البني .

الفصل الثاني

الهرمونات النباتية

(هرمون الجبريلين GA3)

1- الهرمونات النباتية :**1-1- تعريف الهرمونات النباتية :**

تخلق في الانسجة النباتية مركبات عضوية تعرف بالهرمونات (Phytohormones) تعتبر بمثابة اشارات كيميائية تنتج بكميات ضئيلة في عضو نباتي معين لتنتقل الى اعضاء نباتية اخرى لتنظيم عمليات حيوية فهي نوع من المنظمات (Regulator) تظهر محصولته في نمو و تطور النباتات (المريقي; 2005) كما تنقسم الهرمونات النباتية الى خمسة مجموعات رئيسية هي الاوكسينات -الجبريلينات-السيتوكينينات-الاثيلين وحمض الابرسيك.(غروشة ; 2019).

2-1- خصائص الهرمونات النباتية :

- تنتج من الانسجة الانشائية في النبات أو اعضاء نباتية معينة
- تنتقل الى بقية اجزاء النبات
- تعمل معتمدة على تركيزاتها
- تسبب استجابة فسيولوجية معينة للنبات

3-1-اقسام منظمات النمو :

يمكن تقسيم منظمات النمو الى مجموعتين مختلفتين بحسب الاستجابة الفسيولوجية في النبات هما:

- مجموعة منشطات النمو : التي تبني في مراكز خاصة في النبات وتزيد من درجة النمو مثل الاوكسينات-الجبريلينات-السيتوكينينات.
- مجموعة مثبطات النمو النباتية :وهي منظمات النمو الطبيعية والصناعية التي تثبط النمو مثل حمض الابرسيك و الاثيلين .(غروشة ; 2019)

1-4- أنواع الهرمونات النباتية :

الجدول (5) : اهم عائلات الهرمونات النباتية و بعض الوظائف الفسيولوجية (Hopkins;

2003)

الهرمون	مكان التخليق	الاكتشاف	الحركة	الدور الفسيولوجي
الاوكسينات	قمم السيقان و الاوراق الفتية	Wint. 1928	قطبية من الاعلى الى الاسفل عبر اللحاء	- تحفيز تطاول السيقان والجذور - تحفيز تطاول الخلايا وتمايزه - تحفيز الانقسام الخلوي - تحفيز تطور الازهار والثمار الحمية - يساهم في الانجذاب الضوئي و الانجذاب الارضي .
السيتوكينينات	الجذور	Miller et al 1956	غير قطبية في كل الاتجاهات في الخشب واللحاء	- تحفيز انقسام ونمو الخلايا . - تحفيز تجديد البراعم و ازالة السيطرة القمية. - تمايز اعضاء النبات - ضرورة لتحريك المواد المغذية . - تؤخر شيخوخة الاوراق - كسر الحياة البطيئة للبذور و البراعم.
الجبريلينات	مناطق النمو مثل قمم الاعصان والجذور الفتية	Yabuta et sumik 1938	غير قطبية في كل الاتجاهات في الخشب واللحاء	- تنظيم تطاول السيقان . - تحفيز انتاش البذور . - تحفز عملية الازهار . - يحفز تركيب الفا اميلاز خلال انتاج البذور

<ul style="list-style-type: none"> - تحفز نضج الثمار - يقلل السيطرة القمية - يثبط تطاول السيقان و الجذور - يؤخر الازهار و يحفز نضج الثمار - يؤخر هجرة AIA 	<ul style="list-style-type: none"> كل الاتجاهات بالانتشار الغازي 	<p>Cane.R 1934</p>	<p>جميع اعضاء النبات</p>	<p>الاثلين</p>
<ul style="list-style-type: none"> - مسؤول عن تحريك المركبة ضوئيا الى الحبوب خلال نضجها - ينظم انتاش البذور - يحفز تركيب البروتينات في الحبوب 	-	<p>Waring p.f 1964</p>	<p>قلنسوة الجذور</p>	<p>حمض الابسيسيك</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تحفز النمو عموما - رفع مقاومة النباتات للاجهاد الحراري 	-	-	<p>جميع خلايا النبات</p>	<p>الامينات المتعددة</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تثبيط تطاول الخلايا عند النباتات النامية - تساهم في تطور النبات. 	-	-	<p>حبوب الطلع -الاوراق -الازهار</p>	<p>البراسينو- ستيروويد</p>

2-هرمون الجبريلين :**2-1-تعريفه :**

يتواجد هرمون الجبريلين طبيعياً في أعضاء النبات المختلفة في الأوراق الحديثة التكشف و عند منطقة البراعم القمية وفي أطراف الجذور و ينتقل بواسطة خلايا اللحاء و الخشب الى أعضاء نباتية اخرى ، و لميتابوليزم الجذور اهمية كبيرة في امداد أعضاء النبات بهذا الهرمون فقد وجد (Reid et al ;1996) ان هذا الهرمون ينتقل من الجذور الى باقي الاعضاء واي اعاقه تحدث في منطقة الجذور خاصة عندما تزداد الرطوبة الارضية فانه يحدث نقص شديد في هذا الهرمون بالمناطق العلوية للنبات. ويعتبر هذا الهرمون اقل تاثراً بالضوء عن الاكسينات وتركيزاته المرتفعة اقل ضرراً منه. (المريقي; 2005).

2-2-اكتشافه :

تعتبر الجبريلينات المجموعة الثانية التي تم اكتشافها بعد مجموعة الاكسينات ، من قبل العالم الياباني كوروساوا Kurosawa سنة 1926 عند دراسته لمرض الباردة الحمقاء Foolish Seedling في نبات الرز نتيجة إصابتها بالفطر *Fusarium moniliform* حيث لاحظ بأن سيقان وأوراق النباتات المصابة بهذا المرض تنمو بشكل كبير وشاذ إذ تبدو تلك النباتات طويلة ونحيفة وأحياناً خالية من الحبوب . وقد بين العالم Kurosawa بأن خالصته المأخوذة من هذا الفطر يسبب ظهور أعراض المرض نفسه في النباتات الطبيعية السليمة اذا ما عوملت به . وقد تبين أن المسبب المرضي *Fusarium moniliform* يعمل على افراز مادة معينة في النباتات التي يصيبها وإن هذه المادة محفزة لاستطالة السيقان والأوراق .

في عام 1939 تم استخلاص مادة بلورية من الراشح الغذائي الذي سبق أن نما عليه الفطر *Fusarium moniliform* وسميت هذه المادة بالجبرلين -A- Gibberellin نسبة الى الفطر الذي استخلصت منه هذه المادة أول مرة .

بسبب الحرب العالمية الثانية توقفت الابحاث اليابانية واستمرت الابحاث الامريكية والانكليزية من شركة المواد الكيماوية الملكية في إنكلترا وأعلنوا عن عزل مركب جديد من رواشح الوسط الزراعي لهذا الفطر سمي GA3 .

في عام 1955 أعادوا اليابانيين أبحاثهم واكتشفوا ثلاثة جبرلينات أخرى هي GA1 و GA2 و GA3

في عام 1963 اكتشفت GA7 و GA9 من قبل شركة المواد الكيماوية الملكية في إنكلترا .

توالت اكتشاف الانواع الاخرى من الجبرلينات وزاد أعدادها سنة بعد أخرى وقد أكد العلماء وجود الجبرلينات في اغلب النباتات الراقية وأنها تلعب دور مهما في النمو وعملية التمايز للنباتات الراقية .

(غازي; 2014)

2-3- التركيب الكيميائي :

يتم تخليق هرمون الجبريلين من مركب الايزوبرين (Isopren) فهو يعتبر (di-terpenoid) وهذه تعتبر نواتج أكسدة للكربوهيدرات و الايزوبرين (C₅H₈) كما يحتوي على روابط غير مشبعة. جزئ الجبريلين (Gibberelline) مشتق من المركب الحلقي المعروف ب(Gibban) ويوجد من الجبريلين مشتقات عديدة اهمها حمض الجبريلليك ويرمز له ب(GA3) يحتوي على مجموعة أو مجموعتين من الكربوكسيل (COOH). ويوجد هذا الحمض في صورة حرة وان كانت هناك مشتقات من الجبريلين مرتبطة بالبروتين .ويوجد ايضا مشتقات مرتبطة بمجاميع عضوية مثل ال (Gibberelline- acetyl)

(Gibbelline- glycoside) وهذه تعتبر مركبات لتخزين هذا الهرمون بها. ويتكون جزئ الهرمون من حلقتين سداسيتين و حلقتين خماسيتين فهو يعتبر مركب معقد يتكون من 19-20 ذرة كربون وفي الغالب معهم حلقة لاکتون Lactonring (المريقي ; 2005)

الوثيقة (9) : صورة توضح التركيب الكيميائي للجبريلين

2-4-مكان تخليقه :

وجد Jones & Phillips (1966,1967) بعد عمل العديد من التجارب على نبات دوار الشمس من حيث دراسة انتقال و انتشار و استخلاص GA وكذلك المعاملة بمثبطات تخليق GA. وتمكنوا في النهاية من اثبات ان يتم تخليقه في الاوراق الصغيرة و الحديثة للبرعم الاطرفي .

كذلك وجد ان قمم الجذور تعتبر مواقع لتخليق و تتركز منطقة التخليق في المنطقة الطرفية للجذور وهي حوالي (3-4 مم). و الدليل على تخليق في قمم الجذور هو ما قام به كل من Sitto & Vaadia (1967) حيث ازالو القمة الطرفية للساق في نبات عباد الشمس ثم حفظت قمم الجذور في مادة Mevalonate مشعة (تحتوي على C14) فادى ذلك الى انتاج مواد وسطية في تخليق الجبريلين مثل Kaurene.

كذلك بالتجارب وجد ان البذور اثناء التكوين تكون غنية جدا بمحتواها من وهذا دليل على ان البذور نشطة جدا في تخليق الجبريلين .ولوحظ ايضا ان البذور لا تحتوي فقط على

معدل مرتفع ولكنها تحتوي كذلك على كمية كبيرة من مثبطات تخليق الجبرلين وذلك لمنع تراكم الجبرلين في البذرة ، كذلك وجد ان البذور اثناء الانبات يحدث بها تخليق للجبرلين وذلك في خلال اليومين الاولين من الانبات ويتم التخليق في القصعة Scutellum لجنين الشعير (محب; 2002).

5-2-التأثيرات الفسيولوجية للجبرلينات :

• استطالة الخلايا :

للجبرلينات القدرة على استطالة الخلايا و التغلب على التقزم الوراثي في بعض النباتات القزمية مثل الذرة والبازلاء الفاصوليا وغيرها الناتج عن الطفرة الوراثية في جين واحد وإن هذه الطفرة تؤثر في احدى العمليات الحيوية المتعلقة بتكوين الجبرلينات .
إن ظاهرة التقزم الوراثي لا تكون في قلة عدد السلاميات وإنما تكون في قصر السلاميات لذا فان إضافة الجبرلين ستزيد استطالة الخلايا في هذه النباتات وتجعلها طويلة شبيهة بالنباتات الاعتيادية ، وأن تأثير الجبرلينات على نمو السلاميات أكبر في الذرة القصيرة مقارنة بالنباتات الطويلة أي أن الجبرلين المضاف لبعض النباتات الطويلة لا يؤثر على هذه النباتات مثل تأثيرها على النباتات القصيرة ، ويعتقد أن الطفرة الوراثية ناتجة عن وجود بعض المثبطات الطبيعية وبتراكيز عالية والتي تعرقل فعالية الجبرلين وعملية النمو وعند إضافة الجبرلين فإنها تزيل تأثير هذه المثبطات في النباتات القزمية .

• حث الازهار واحلالها لبعض تأثيرات الظروف البيئية :

للجبرلينات القابلية على حث الازهار في بعض الانواع ، حيث أن الانواع المختلفة من النباتات لها احتياجات محددة في طول نهار معين ويجب أن تتعرض لهذه الاحتياجات قبل تكوينها للازهار . فمثلا النباتات الحولية ذات النهار الطويل

مثل الخس والفجل والخردل والسبيناغ عندما تنمو تحت الفترة الضوئية القصيرة غير المحثة للأزهار تظهر فيها زيادة ملحوظة في استطالة الساق ، ولقد حثت هذه النباتات للأزهار و انتجت بذورا عند معاملتها بالجبرلين .

• تمدد الورقة :

إن معاملة النباتات بالجبرلين تؤدي إلى زيادة نمو الورقة فتصبح أوراقها أعرض أو تستطيل أكثر وبالتالي زيادة حاصل الوزن الجاف للنباتات بسبب زيادة مساحة التمثيل الضوئي التي تؤدي إلى زيادة مجموع الحاصل .

• كسر طور السكون في النباتات والبذور :

تتوقف بعض النباتات عن النمو في الخريف ولا تستعيد نموها إلى أن تجهز بمعاملات برودة محددة وإن الرش بالجبرلين تنهي الحاجة إلى البرودة وتساعد النباتات على استعادة نموها .

يحتاج العديد من البذور إلى فترة معينة بعد النضج أو المعاملة بالبرودة أو التعريض للاضاءة قبل انباتها ، وإن هذه الاحتياجات يمكن التخلص منها بواسطة فعل أو تأثير الجبرلين فعلى سبيل المثال يمكن أن تلغى الحاجة إلى الضوء لبذور الخس والتبغ بإضافة الجبرلين وإن الرش بالجبرلين يلغي الحاجة إلى البرودة لبذور الخوخ.

• إنبات البذور :

إن عملية نقع البذور في محاليل من الجبرلين تؤدي إلى زيادة معدل سرعة الانبات وزيادة نسبة الانبات وكذلك زيادة طول البادرات النامية قياسا بالبذور المنقوعة في الماء فقط .

• زيادة العقد الثمري :

يسبب الجبرلين زيادة عقد الثمار إلى أعلى ما يمكن قياسا الى النباتات الغير المعاملة لعدم سقوط الازهار المتكونة ، فقد وجد أن رش حامض الجبرليك على أشجار البرتقال قبل موسم التزهير أو قبل سقوط الثمار الصغيرة يؤدي إلى غزارة الانتاج الثمري .

• تحفيز تكوين الثمار العذرية :

ثبت أن للجبرلينات دور متميز بظاهرة التوالد البكري وتكوين عديمة البذور فقد وجد أن معاملة رش أزهار التين الشوكي مرتين أو ثلاثة مرات خلال أسبوعين قبل عمليتي التلقيح والاختصاص بحامض الجبرليك تؤدي إلى تكوين الثمار للابذرية ذات الأعداد الغزيرة والأحجام الكبيرة مصحوبة بارتفاع السكريات وتحسين المظهر الخارجي للثمار .

• نمو الجذور :

أثبتت التجارب بأن ليس للجبرلينات تأثير على نمو الجذور ، وأن الجبرلينات لا يمنع بدء تمييز الجذور فقط ولكنه أيضا يبطل تحفيز الأوكسينات للجذور كما في التجارب التي أجريت على تجذير العقل بواسطة الأوكسينات والجبرلينات . (غازي ; 2014)

2-6-تأثير الجبرلين على الانبات :

بالنسبة للانبات فالجبرلين ينبه تركيب الفا اميلاز في البذور خاصة في اغشية الحبوب ،حيث لالفا اميلاز دور مهم في انبات البذور الالبومينية لكونها تسمح بتتمية مخزونات النشاط التي تشكل الالبومين ينتج عن ذلك سكريات الارز التي تستعملها مباشرة من طرف الجنين ،كما ورد عن (J-lafon ;1988).

كما وجد ان الجبرلينات تعالج الكمون في البذور و البراعم في العديد من الاصناف النباتية و تعمل كبديل لدرجة الحرارة المنخفضة و النهار الطويل و الضوء الاحمر و يرجع تاثير الجبرلين اساسا في البذور الى سرعة استطالة الخلايا بحيث ان الجذير يندفع بسرعة خلال غلاف البذرة (باصلاح ; 1998).

2-7-تأثير الجبرلين على الملوحة :

اجرى كثير من العلماء ابحاثا على استجابة نمو الكثير من النباتات للملوحة سواءا كانت ملحية أو غير ملحية وقد تركزت معظم الدراسات على استخدام ملح كلوريد الصوديوم

كمصدر للملوحة ، ويلعب هرمون GA3 دورا هاما في علاج الاضرار الناتجة عن الملوحة على نباتات مختلفة فقد اشار (Monselise and Halevg;1962) عن (رمزية ; 2004) انه عند رش بادرات نبات الفاصولياء بواسطة حمض الجبريليك بتركيز (50-1600 ppm) زاد طول الساق و العقل بينما لم يتاثر عدد الاوراق و قلت مساحتها ، كما ان نبات الخردل التي رشها بحمض الجبريليك بتركيز (5-10) مول عند (40-60-80) يوما من الزراعة حدثت زيادة كبيرة في طول الساق و عدد ومساحة الاوراق و الوزن الجاف خاصة عند عمر 40 يوما .

2-8- علاقة حمض الجبريلين (GA3) بالعمليات الميتابوليزمية :

- يدفع هذا الهرمون تخليق انزيمات التحلل المائي مثل انزيمات تحلل النشاء و الجلوكوز و البروتين و الحمض النووي ARN
- يؤثر هذا الهرمون على ميتابوليزم الاحماض النووية ADN و ARN من خلال عمليات النسخ وترجمة الشفرة الوراثية .
- ينشط هذا الهرمون تخليق الفوسفوليبيدات (phospholipds) و بالتالي يساعد في تكوين الاغشية الخلوية
- لهذا الهرمون تاثير على تخليق هرمونات اخرى فقد وجد ان GA يرفع تركيز الاكسين من خلال تخليق مزيدا من جزيئات الاندول (IAA) فيحدث تمدد في الخلايا نتيجة تاثيره على الجدر الخلوية (المريقي; 2005).

الفصل الثالث

الإنبياء

1-تعريف الانبات :

الانبات هو عملية استعادة الجنين الساكن لنشاطه ونموه ، ويبدأ ذلك بتمزق اغلفة البذرة وخروج النبات الصغير منها كما يمكن تعريف الانبات بانها الخطوات المتتابعة التي تبدأ بامتصاص البذرة للماء والتي يتبعها تمزق غلاف البذرة وظهور الجذير أو المجموع الخضري و يصاحب تلك المظاهر المورفولوجية انقسام الخلايا و استطالتها مع زيادة النشاط الحيوي من هضم للغذاء وتمثيله .
(قادري; 2018)

الوثيقة (10) : صورة توضح انبات بذور الكينوا

2-مراحل الانبات :

يمكن تقسيم عملية الانبات الى عدة مراحل منفصلة ، وذلك بغرض تفهم كل مرحلة منها على حدا ، الا انها في حقيقة الامر مراحل متداخلة مع بعضها ، وهذه المراحل هي:

المرحلة الاولى (مرحلة امتصاص الماء) :

وفيها تقوم المواد الغروية في البذور الجافة بامتصاص الماء مما يزيد من المحتوى الرطوبي للبذور ، ويعقب ذلك انتفاخ البذرة وزيادة احجامها وقد يصاحب هذا الانتفاخ تمزق اغلفة البذرة وتجدر الملاحظة هنا ان عملية امتصاص الماء وانتفاخ البذرة يمكن ان تحدث حتى مع البذور الغير حية (Chaussat; 1999).

المرحلة الثانية (مرحلة هضم المواد الغذائية) :

ويحدث في هذه المرحلة تحول المواد الغذائية المعقدة مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات المخزنة في الاندوسبارم أو الفلقات الى مواد بسيطة والتي تنتقل الى نقط النمو الموجودة بمحور الجنين ، والتي يسهل على الجنين تمثيلها (ادريس وصبحي ; 2009).

المرحلة الثالثة (مرحلة النمو) :

وفي هذه المرحلة يحدث نمو البادرة الصغيرة كنتيجة لاستمرار الانقسام الخلوي الذي يحدث في نقط النمو المختلفة والموجودة على محور الجنين ويتقدم مراحل النمو وتأخذ البادرة الشكل الخاص بها .

ويتكون الجنين من المحور الذي يحمل واحدة أو اكثر من الاوراق الفلقية ، والجذير الذي يظهر من قاعدة محور الجنين ، بينما تظهر الريشة من الناحية العلوية لمحور الجنين فوق الاوراق الفلقية . ويقسم ساق البادرة الى السويقة الجنينية العليا والتي توجد اعلى الفلقات ، والسويقة الجنينية السفلى التي توجد اسفل الفلقات (ادريس وصبحي ; 2009).

3-انواع الانبات :

وياخذ انبات البذور صورتين مختلفتين هما :

الانبات الهوائي : وفيه تنمو السويقة الجنينية السفلى الى الاعلى ،حاملة الفلقات لتظهر فوق سطح التربة ، كما في حالة انبات بذور الكرز (ادريس وصبحي ; 2009).

الإنبات الارضي : في هذه الحالة تنمو السويقة الجنينية السفلى الا انها لاتتمدد بالقدر الذي يسمح برفع الفلقات فوق سطح التربة ولكن الذي يظهر فوق سطح التربة هي السويقة الجنينية العليا ، كما هو الحال عند انبات بذور البازلاء . (Gampine;1992)

4-العوامل البيئية التي تؤثر على انبات البذور :

- الماء : يعتبر الماء من العوامل البيئية الاساسية اللازمة لحدوث الانبات حيث ان النشاط الانزيمي وعمليات هدم وبناء المواد الغذائية المختلفة تتطلب لاتمامها وسطا مائيا . وكما هو معروف فان انبات البذور يتحكم فيه بصفة اساسية محتواها المائي ، فالبذرة عادة لاتتبت اذا كان محتواها الرطوبي اقل من 40-60% (على اساس الوزن الطازج) . وعند زراعة البذور الجافة تقوم بامتصاص الماء بسرعة في بادئ الامر حتى يحدث التشبع والانتفاخ ، ثم يعقب ذلك انخفاض في معدل امتصاص الماء والذي لايلبث ان يزداد بظهور الجذير وتمزق الغلاف .وقدرة البذرة على امتصاص الماء تتوقف على عدة عوامل هامة منها نفاذية اغلفة البذرة للماء والماء المتاح بالوسط المحيط بالبذرة وايضا درجة حرارة الوسط أو البيئة ، فنجد ان ارتفاع درجة حرارة البيئة يزيد من معدل امتصاص البذرة للماء . وبانبات البذرة وتكوين الجذير تبدأ البادرة الصغيرة في الاعتماد على مجموعها الجذري ومقدرته على تكوين شعيرات جذرية صغيرة اخرى تساهم في امتصاص الماء من الوسط المحيط وكمية الماء التي تمتصها البذرة خلال فترة الانتفاخ وحتى ظهور الجذير تعتبر الاهم حيث انها يمكن ان تؤثر على كل من نسبة ومعدل انبات البذور .

- الحرارة : تعتبر الحرارة من أهم العوامل البيئية التي تنظم عملية الإنبات وتتحكم بدرجة كبيرة في نمو الشتلة أو البادرة . وعموما فان للحرارة تأثيرا على نسبة ومعدل إنبات البذور حيث أنها عند درجات الحرارة المنخفضة يقل معدل الإنبات وبارتفاع درجة الحرارة يزيد هذا المعدل حتى يصل إلى المستوى الأمثل ، ولكن بزيادة درجة الحرارة عن هذا الحد يقل معدل الإنبات نتيجة للضرر الذي يحدث للبذرة وعلى العكس من ذلك فان نسبة الإنبات

ربما تظل ثابتة إلى فترة محددة بارتفاع درجة الحرارة وحتى تصل هذه الدرجة إلى المستوى الأمثل وحتى يتوفر الوقت الذي يسمح بحدوث الإنبات . (الحيايى ; 2015)

- **الغازات :** يحتوي الهواء الجوي على ثلاث غازات أساسية ضمن مكوناته وهي الأكسجين و ثاني أكسيد الكربون و النيتروجين . ويعتبر الأكسجين ضروري جدا لإنبات بذور كثير من الأنواع النباتية . أما اذا ارتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون عن 0.03 % في البيئة فغالبا ما يثبط ذلك إنبات البذور و تقل نسبة إنبات بعض البذور اذا قل توفر الأكسجين . (بوشامة و بوقزوح ; 2013)

- **الضوء :** يمكن للضوء ان يؤثر على انبات البذور ، وتختلف احتياجات بذور الانواع النباتية المختلفة للضوء فهناك بعض النباتات مثل نوع التين تحتاج بذورها الى ضوء تام ومستمر حتى تنبت ، و تفقد هذه البذور حيويتها خلال بضعة اسابيع اذا لم تعرض للضوء . كما يشجع الضوء انبات بذور مجموعة اخرى من الانواع النباتية تشمل كثير من انواع الحشائش و الخضر و الزهور ، وقد يثبط الضوء انبات بذور بعض الانواع النباتية الاخرى مثل البصل وتستجيب بعض النباتات لطول النهار (الفترة الضوئية) فهناك بذور تحتاج الى نهار طويل لكي تنبت مثل البذور البتولا ولكن يلزم ايضا تعريض هذه البذور لفترة برودة معينة حتى تساعد على انباتها ، بينما يثبط النهار الطويل انبات بذور بعض الانواع الاخرى . (ادريس وصبحي ; 2009)

الفصل الرابع

الملوحة والإجهاد الملحي

1-تعريف الملوحة :

تعتبر ملوحة التربة والماء احد المشاكل التي تواجه الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة المروية ، حيث تسبب ضياع معتبر للانتاج النباتي وزوال الكثير من المحاصيل الحساسة للملوحة من تلك المناطق ، كما يرى (عزام ؛ 1977) ان الاراضي الملحية هي التي تحتوي على نسبة عالية من الاملاح المعدنية المتعادلة بدرجة لا تسمح بنمو النباتات نموا طبيعيا ومن بين هذه الاملاح كلوريد الصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم وغيرها ، ومن الصعب تحديد نسبة الاملاح في التربة لانها تتأثر بعدة عوامل منها :

- قوام التربة
 - نسبة الاملاح في قطاع التربة.
 - نسبة الرطوبة في التربة
 - نوع الاملاح الذائبة وكذلك نوع وصنف النباتات المزروعة (حرزولي و تليلي ؛ 2019).
- كما تعد الملوحة العائق الرئيسي لانتاج الحبوب في المناطق الجافة و شبه جافة من حوض البحر الابيض المتوسط (Sayar et al ؛ 2010) اذ تحد من نمو و انتاجية المحاصيل الزراعية
- (Munnse et Tester; 2008) وهذه الحالة ناتجة عن تراكم الاملاح القابلة للذوبان في التربة (الكردي ؛ 1977) .

2-تعريف الاجهاد الملحي :

ينشأ الاجهاد الملحي نتيجة زيادة تركيز الاملاح واهمها املاح الصوديوم (كلوريد الصوديوم ، كربونات الصوديوم ، كبريتات الصوديوم) وتعد الاراضي مالحة عندما يصل تركيز الاملاح في التربة الى مستوى يثبط نمو معظم نباتات المحاصيل ، وبما ان النباتات تختلف اختلافا كبيرا فيما بينها في درجة مقاومتها للاجهاد الملحي فانه من الصعب تحديد

تركيز معين من الملح يمكن استخدامه للتمييز بين الاراضي المالحة والغير مالحة ، وعموما تعد الاراضي مالحة اذا زاد تركيز الملح فيها عن % 0.1 .

تزداد مشكلة الملوحة بدرجة اكبر في المناطق الجافة لكون كمية الامطار لاتكفي لغسل الاملاح المتجمعة من التربة بعيدا عن منطقة الجذور كما تتميز بارتفاع معدلات البخر . (حشمت و حمدي ; 2008)

3-تأثير الاجهاد الملحي على عملية الانبات :

تعتبر مرحلة الانبات من اشد اطوار نمو النبات حساسية للملوحة ، كما ان الكثير من الانواع النباتية بذورها لا تنتش أو تعاني نقصا في معدل الانبات و استطالة كل من الجذير و السويقة في الاراضي عالية الملوحة وذلك راجع لسببين رئيسيين :

-زيادة الضغط الاسموزي لمحلول التربة يؤدي الى ابطاء تشرب البذور و الحد من امتصاص الماء اللازم لتحريك مختلف عمليات الايض .

-تسمم الجنين نتيجة للتركيز المرتفع لبعض الايونات خاصة -Cl . (عسيلة ; 2019)

4-اقسام النباتات :

تقسم النباتات حسب استجابتها للإجهاد الملحي الى أربعة مجموعات هي :

4-1-نباتات حساسة : وهي التي ينخفض انتاجها ب20 % بعد ملوحة تقدر ب (2 غ /

لتر) مثل الفاصوليا ، البصل ، العدس ...

4-2-نباتات مقاومة نوعا ما : وهي تتحمل تراكيز من الملح مقدارها (3.5 غرام/لتر) مثل الجزر والخوخ .

4-3-نباتات مقاومة : وهي تتحمل حتى (10 غرام / لتر) من الملح مثل الطماطم الذرى

القمح الشعير

(Hazegawa et al; 2000)

4-4- نباتات شديدة المقاومة :

وهي ذات اهمية خاصة للزراعة في الترب المالحة كالسبانخ ، الشمندر ، القطن ، نخيل البلح الذي يتحمل حتى (18 غ / ل) من الملح (Heller et al; 1998)

5-تأثير الملوحة على مرفولوجية النبات :**1-5- على مستوى الجذور:**

تبدي جذور بعض الحبوب تأثير أقل من الأجزاء الهوائية اذا تعرضت لتراكيز عالية من الملوحة مما يؤدي إلى قصرها وقلة عددها (طويوي وجميلي ; 2013).

وفي دراسة أجريت على قطع القمح النامية في وسط NaCl بتركيز 50 م مول لوحظ تثبيط النمو الطولي والأفقي للجذور، حيث يحدث اضطراب في عملية انقسام الخلايا واستطالتها (بوعزيز ; 1980).

2-5- على مستوى السيقان:

في دراسة على الحبوب الحولية أجريت تجارب بإضافة تراكيز من NaCl فوجد أن قطر الساق الرئيسي يكون صغير كما أن التفرعات قصيرة(بوعزيز ; 1980).

3-5- على مستوى الأوراق:

تؤثر الملوحة على النباتات اذا زاد تركيزها على الحد المطلوب،تسبب التفاف الأوراق أو عدم انبساطها الطبيعي، كما يظهر على بعضها احتراق قممها، اذا كانت هذه الأخيرة خاصة بالنباتات الفتية فإن اضافة NaCl للوسط القاعدي يسبب ظهور أعراض نموذجية حسب تركيز الملح، قد تسبب التراكيز العالية من الملوحة في سقوط جزئي أو كلي للأوراق، خاصة في النباتات الحساسة للملوحة كالفاصوليا والبقول (Guenier ; 1983).

6-استجابة النباتات للملوحة:

تتعرض النباتات التي تنمو في الظروف الملحية الى اضطرابات فيزيولوجية وبيو كيميائية (Ben Naceur ;2011). وتختلف استجابة النبات للملوحة على حسب الأصناف، وتركيز الأملاح في الوسط، وظروف الزراعة والنمو ومراحل تطور النبات (Malek 1998 et al ; ويمكن تقسيمها الى :

6-1-التحمل والحساسية:

تحمل الأملاح من طرف النباتات مرتبط بقدرتها على التنظيم وبتطور النمو، حيث وضحت تحاليل المقارنة للتغذية المعدنية أن النوع الأكثر تحملا للأملاح هو الذي له القدرة على نقل الصوديوم Na في الأجزاء الهوائية للنباتات، وفرز الأملاح الزائدة على سطح الأوراق مما يجعله يحافظ على التركيز الثابت في النسيج النباتي (كاظم؛ 1985) ونتكلم عن التحمل عندما يكون نمو النباتات عاديًا مقارنة مع الشاهد وعن الحساسية عند ظهور أعراض النقص أو المعاناة، ويفسر تحمل النباتات للملوحة إلى عدة أسباب منها: تركيب الجدار النباتي (Chawarz et Gale;1984) حيث يكون في الجذور سميكا وغنيا بالجنين (يخلف; 1991)، درست تأثيرات الملوحة على أصناف من النباتات السكرية والملحية وبالرغم من ذلك تبقى الية تحمل الملوحة غير مفهومة جيدًا (2000; Hazegawa).

6-2-التأقلم:

وهو قابلية النبات للتكيف مع ظروف الوسط الملحي، وتختلف بحسب الأنواع النباتية(فرشة; 2001) وللتأقلم مع ظروف الوسط يستعمل النبات العديد من الآليات الفسيولوجية مثل خفض إمتصاص الأيونات السامة والمتراكمة في فجوات الجذور وخفض الأيونات المتراكمة في الأعضاء الفتية والقمم النامية من الجزء الهوائي، وطرح الكلور -Cl

من الأعضاء الهوائية، لأن الكلور في البيئة المالحة يبطل إمتصاص ونقل No-3 الأيونات لمسافات كبيرة والتي تكون ضرورية للنمو خاصة النترات (عمراني; 2006).

3-6-المقاومة:

مقاومة الملوحة من طرف النبات ظاهرة معقدة جدا، نظرا لتدخل العوامل المورفولوجية و التطورية الخاصة بالعملية الفيزيائية و البيوكيميائية في هذه الظاهرة (Kadri et al; 2001) وتحدث المقاومة نتيجة لعدة ميكانيزمات و التي تسمح للنبتة بإكمال نشاطاتها الأيضية دون ان تتأثر بالوسط الخارجي الذي يكون مجهدا جدا (حراث; 2003) ومن الميكانيزمات نذكر:

أ-التعديل الأسموزي :

التعديل الأسموزي او التكيف الأسموزي هو ارتفاع الضغط الأسموزي أو انخفاض الجهد المائي للمحتوى الخلوي نتيجة تراكم المواد الذائبة من اجل ميكانيزم المقاومة (سعيد; 2006).

التنظيم الأسموزي هو التحكم في الانتفاخ، او حجم الخلايا والمنظم بواسطة الأنشطة الأيضية للخلايا (فرشة ; 2001).

ب-التوزيع الداخلي للأيونات:

تكون القدرة على تبادل الأيونات نوعية، اي خاصة بنوع النباتات والأيونات حيث يوجد ميكانيزم لتبادل ايونات الصوديوم Na على مستوى غشاء الجذور، والمتعلقة بمضخة البروتون H تعتمد المضخة في اخراجها للصوديوم إدخالها البوتاسيوم على انزيمات ATPases . التوضع الداخلي للأيونات ناتج عن نشاط انزيمات تعتمد على الطاقة، فيكون التراكم الاختياري للبوتاسيوم K في السيتوبلازم والصوديوم في الفجوات (Luttge; 1983) .

ج-الطرد والاقصاء :

يكون الطرد أو الاقصاء لأيونات بالحد من دخول أيونات الصوديوم Na والكلور Cl إلى داخل النبات، حيث يتم إيقافها على مستوى مراكز الامتصاص وتتراكم في أنسجة الجذور (Luttge; 1983) بفضل تأثير أيونات الكالسيوم Ca^{+2} على النفاذية الخلوية (فرشة ; 2001) (عمراني; 2006).

د- الإفراز:

يتم إفراز الملح بواسطة الغدد و الأوبار الحويصلية إلى السطح الخارجي للأجزاء الهوائية للنبات حيث يسمح بالحفاظ على تركيز ثابت للأملاح في الخلايا. ويكون الإفراز في الإجهاد الملحي (Luttge; 1983).

يمكن اعتبار أنظمة الضخ العاملة على مستوى أغشية الفجوات بمساعدة انزيمات ATPases كآلية لإفراز النشاط حيث تقوم بضخ الصوديوم إلى داخل الفجوات (Luttge; 1983) توجد هذه الأنظمة عند النباتات المقاومة كالشعير (فرشة; 2001).

هـ- التمييه والتخفيف:

تكون عملية التمييه مرتبطة باحتباس شديد للماء وحدوث الانتفاخ الخلوي في النباتات المقاومة.

• طرق اخرى لمقاومة الملوحة:

للتغلب على الضرر على نمو وإنتاج المحاصيل النباتية نتيجة نموها تحت الظروف القاسية للملوحة، يجب الاهتمام بالوسائل الزراعية الحديثة، مثل استخدام الأسمدة البوتاسية بالقرب من الجذور، وهذا لارتفاع كلوريد الصوديوم بين الحبيبات الترابية (غروشة; 2003) استخدام بعض المركبات الكيميائية مثل: منظمات النمو.

7-أثر الملوحة على المؤشرات الوظيفية للنبات:

7-1-أثر الملوحة على تراكم البرولين:

يعتبر البرولين من أهم الأحماض الأمينية التي تتراكم في النباتات الدنيئة والراقية عند تعرضها للإجهاد المائي والملحي (Alam et Azmi ; 1990)، يلعب دور وقائي اسموزي فعال (Roosens ; 1998) فالبرولين يتراكم في النباتات الراقية المجهددة أسموزياً من خلال تحفيز تخليقه من جديد ووقف عملية هدمه (Delauneg et Verma ; 1993).

إن تعرض النبات لزيادة من NaCl يؤدي إلى تراكم البرولين بكميات كبيرة، مما ينتج عنه سمية لهذا النبات ويصاحبه زيادة في كمية السكر. وذلك للتخلص من سمية البرولين، كما أن زيادة NaCl في الخلية النباتية زاد من سمية البرولين وللتخفيف من هذه السمية لابد من هدم البرولين عن طريق التخفيف من Prolin dyhydrogenase، حيث أن هدم البرولين يثبط تحت شروط الإجهاد المائي والملحي (Peng et al ; 1996). أكد (Khalid et al; 2009) أن تركيز البرولين يرتفع بارتفاع تراكيز الملوحة وأن هذا التأثير يكون معنوي. وبين (Djerroud et al ; 2010) في دراسته على صنفين من نوع Atripelex بعد اسبوع من التوتر الملحي أن اختلاف تراكم البرولين يتوقف على العنصر الذي تراكم فيه نوع النبات ومقدار كمية الملوحة في الوسط.

7-2-أثر الملوحة على تراكم السكريات :

وجد كل من (Locy et al ; 1996) أن زيادة محتوى السكريات الذائبة والمختزلة في النباتات المجهددة لها علاقة بارتفاع محتوى الكلور وانخفاض محتوى البوتاسيوم، مما يؤدي إلى نقص السكريات الذائبة، الأمر الذي يحدث نقص أو انخفاض في النمو. كما تعمل الملوحة على تنشيط المواد الكربوهيدراتية الكلية مثل السكريات الثنائية خاصة السكروز وتقليل السكريات الأحادية كالجلكوز (الشحات ; 2002)، (Cherki et al ; 2000)، وهذا ما أكدته (Khalid et al ; 2009) كما أوضح (Bernstein et Hayward ; 1958) أنه

في وجود الأملاح تكون محصلة النمو الخضري منخفضة في حين معدلات التمثيل ثابتة في معدلها مما ينعكس ذلك على تراكم الكربوهيدرات المتبقية بتركيز مرتفع.

7-3- أثر الملوحة على الصبغات الخضراء:

حسب (Munnset et al ;1982) جميع النباتات النامية في البيئات الملحية تصفر أوراقها نوعا ما نتيجة قلة كمية الكلوروفيل فيها ونقص اليخضور أو الصبغات الخضراء في الأوراق سببه عدم احتواءها على عنصر الحديد الكافي لدخولها في تركيب الكلوروبلاست المسؤولة عن تخليق وإنتاج البروتينات حيث الملوحة تعيق إمتصاص الجذور لهذا العنصر من محلول التربة.

7-4- أثر الملوحة على عملية النتح:

ينخفض معدل النتح أثناء الملوحة في كامل أجزاء النبات. وأن المحتوى المائي في اوراق نبات الليمون كان يقل بسبب قلة الماء تحت جميع التراكيز الملحية الميسر للإمتصاص من المحلول الأرضي فيرتفع ضغطها الأسموزي داخل الخلايا ويصعب فقد الماء منها كما يعزى نقص النتح إلى عملية غلق الثغور. ويلاحظ أنه توجد علاقة سلبية بين الملوحة والنتح (Kato; 1992) .

7-5- أثر الملوحة على الغشاء الخلوي:

لاحظ (Cherki et al ;2002) أن زيادة تركيز الأملاح تسبب الإختلال في الغشاء بسبب زيادة نفاذية الغشاء، كما تسبب ضرر وتلف على سطحه نتيجة موت موضعي للخلايا التي تصبح مبرقعة (Necrose) وأن التراكم المفرط ل NaCl يؤدي إلى التغيير في البروتينات الغشائية، حيث يكون مصحوب بتغيير في مكونات الأحماض الدهنية وطبيعة الفوسفوليبيدات، فالمعاملة الملحية الضعيفة تعمل على تحسين التوازن الغشائي.

الجزء العملي

الفصل الاول

المواد وطرق العمل

1-الهدف من الدراسة :

يكن هدف هذه الدراسة في مقارنة بين صنفين من بذور الكينوا (V4) و (V7) وذلك خلال مرحلة الانبات في وجود وغياب الجبريلين وذلك تحت تأثير تراكيز مختلفة من الملوحة ، من خلال استنتاج الكفاءة الانباتية (سرعة الانبات ، نسبة الانبات ، طول الجذير والسويقة والوزن الرطب والجاف) لمعرفة مدى تحمل مستويات مختلفة من الاجهادات الملحية وهذه التجربة تمت داخل المخبر بكلية علوم الطبيعة والحياة خلال السنة الدراسة 2021/2020 باستعمال اطباق بلاستيكية .

2-المواد المستعملة :

2-1- المادة النباتية : لمعرفة مدى تحمل نبات الكينوا للاجهاد الملحي أختارنا صنفين من بذورها (V4-V7)حيث اخذت من مزرعة البرهنة التابعة لمعهد تطوير الزراعة الصحراوية ITDS التي جنبت في شهر فيفري 2020 كما تم توفير الكمية الكافية من البذور المراد دراستها.

2-2- ماء السقي : تم في هذه التجربة تحضير عدة تراكيز مختلفة من الملوحة انطلاقا من الماء المقطر (S0=0, S1=200, S2=400, S3=600, S4=800, S5=1000) mmol/l .

2-3- الأدوات : القطن - اطباق بلاستيكية - كؤوس بلاستيكية - مقص - ورق الالمنيوم - مسطرة - شريط لاصق ورقي - مصفاة - شفرة حادة - بيشر - سحاحة .

2-4- المحاليل : ماء الحنفية - ماء مقطر - محلول الجبريلين GA3 تركيزه 75 ppm - محلول كلوريد الصوديوم NaCl - ماء جافيل مخفف بنسبة 2% .

2-5- الاجهزة : الميزان الحساس - الحاضنة .

3-تصميم التجربة:

صممت هذه الدراسة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة حيث استعمل فيها صنفين من بذور الكينوا (V4) و (V7) بعد تنقية وحساب البذور قمنا بتعقيمها بواسطة ماء جافيل مخفف بنسبة 2% لمدة 7 دقائق ومن ثم تصفيتها بمصفاة و غسلها جيدا بالماء المقطر كما هو موضح في الوثيقة (11) ، بعد ذلك قمنا بتقسيم كل صنف في كأسين احدهما وضعنا فيه الجبريلين و الاخر بالماء المقطر ثم قمنا بنقع البذور فيها كل صنف على حدا وتركها لمدة 10 دقائق كما هو مبين في الوثيقة (12) بعد ذلك قمنا بتصفية البذور بمصفاة ، ووضعها فوق قطن في اطباق بلاستيكية نظيفة (20 بذرة في كل طبق) هذه الاطباق موضوعة في المخبر مع مراعات شروط الانبات ، حيث كل صنف من هذه البذور تم معاملتها بخمس تراكيز من الملوحة (S0-S1-S2-S3-S4-S5) وكررت كل معاملة بثلاث مكررات (R1-R2-R3) كما خصص لكل صنف من اصناف الكينوا 36 طبق بلاستيكي ، وبعد ذلك يتم احصاء البذور المنتشة يوميا حيث استغرقت هذه التجربة 8 ايام وفي درجة حرارة مابين 21-22 م ° كما يمكن اعتبار البذرة بانها منتشة بمجرد خروج الجذير ،

الوثيقة (11) : صور توضح عملية تعقيم بذور الكينوا و تصفيتها

الوثيقة (12) : صورة توضح عملية نقع البذور في GA والماء المقطر

1-3- تحضير محاليل السقي :

- وزن 1 مول من كلوريد الصوديوم ذو الوزن الجزيئي 58.50g
- اذابته في 1 لتر من الماء المقطر ثم نرج جيدا ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يذوب الملح في الماء .
- استخراج التراكيز اللازمة من الملوحة (S1,S2,S3,S4,S5) للسقي وذلك بتخفيف المحلول كلوريد الصوديوم كما هو موضح في الجدول (6) و الوثيقة (13):

الجدول (6) : يبين تحضير محاليل السقي

mmol/l 0	1000 ml من الماء المقطر + 0 ml من محلول NaCl	التركيز S0
mmol/l 200	800 ml من الماء المقطر + 200 ml من محلول NaCl	التركيز S1
mmol/l 400	600 ml من الماء المقطر + 400 ml من محلول NaCl	التركيز S2
mmol/l 600	400 ml من الماء المقطر + 600 ml من محلول NaCl	التركيز S3
mmol/l 800	200 ml من الماء المقطر + 800 ml من محلول NaCl	التركيز S4
mmol/l 1000	0 ml من الماء المقطر + 1000 ml من محلول NaCl	التركيز S5

الوثيقة (13) : صور توضح عملية تحضير محاليل السقي

2-3- عملية الزرع :

تمت عملية الزرع يوم 14 فيفري حيث خصص لكل صنف من بذور الكينوا 36 طبق بلاستيكي ووضع القطن فيها وتم توزيع البذور في هذه الاطباق (20 بذرة في كل طبق) هذه الاطباق موضوعة في المخبر مع مراعات شروط الانبات كما تمت عملية السقي يوميا اما الكمية فقد كانت ما تكفي لتغطية البذور ، حيث كل صنف من هذه البذور تم معاملتها بخمس تراكيز من الملوحة .

(S0=0,S1=200,S2=400,S3=600,S4=800,S5=1000) وكررت كل

معاملة بثلاث مكررات (R1-R2-R3) ، وبعد ذلك تم احصاء البذور المنتشة يوميا حيث استغرقت هذه التجربة 8 ايام وفي درجة حرارة مابين 21-22 م ° كما يمكن اعتبار البذرة بانها منتشة بمجرد خروج الجذير .

اما المعاملات و المكررات فهي موضحة حسب الجداول (7) و (8) :

جدول(7): معاملات الصنف الاول لبذور الكينوا (V4)

تراكييز الملوحة	S0		S1		S2		S3		S4		S5	
	G 0	G 1										
R1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R2	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R3	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

جدول (8) : معاملات الصنف الثاني للكينوا (V7)

تراكيز الملوحة	S0		S1		S2		S3		S4		S5	
	G 0	G 1										
R1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R2	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R3	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

حيث :

V4 : الصنف الاول للكينوا (Q18)

V7 : الصنف الثاني للكينوا (Q27)

S0 : ماء مقطر

S1-S2-S3-S4-S5 : تراكيز الملوحة

G0: البذور غير منقوعة في الجبريلين

G1 : البذور منقوعة في الجبريلين

R1 : التكرار الاول

R2 : التكرار الثاني

R3 : التكرار الثالث

الوثيقة (14): صور توضح عملية زرع البذور للصنفين

3-3- جمع العينات :

بعد عملية الانبات تم جمع عينات من بادرات الكينوا المدروسة وذلك عن طريق فصل الجذيرات عن السويقات بواسطة شفرة حادة بعد ذلك قمنا بقياس اطوال كل من الجذيرات و السويقات بواسطة مسطرة مدرجة .

4- قياس الاوزان :

4-1- الوزن الطري :

تمت هذه العملية بعد انتهاء مرحلة الانبات ، وذلك بنزع كامل النبات من الاطباق البلاستيكية ووضع البادرات في شرائح المنيوم مرقمة ومعلمة وزنها مغ 187 ، ليؤخذ الى الميزان من اجل الحصول على الوزن كما هو موضح في الوثيقة (15) .

الوثيقة (15) : صور توضح مراحل عملية قياس الوزن الطري لنبات الكينوا

2-4- الوزن الجاف:

بعد تقدير الوزن الطري تم وضع العينات في حاضنة تحت درجة حرارة 104 درجة مئوية لمدة 4 ساعات للحصول على الوزن الجاف بعد ذلك قمنا بوزن العينات بميزان حساس .

5-المعايير المدروسة :

بعد عملية زرع البذور وسقيها كل يوم بالتراكيز المختلفة من الملوحة كانت الملاحظة يومية متباينة حسب النوع المدروس خلال هذه الفترة تم حساب القياسات التالية :

1-5 نسبة الانبات (GP) Germination Percent :

عدد البذور المنبته * 100 = TG % وذلك حسب (Radford et al ;1968)

العدد الكلي للبذور

2-5 سرعة الانبات (GR) Germination rat :

حسب (حرزولي و تليلي ;2019) تكون سرعة الانبات بالعلاقة التالية :

GR % = (عدد البذور المنبته في اليوم الذي بدا فيه العد × عدد الايام من بداية العد +

عدد البذور المنبته في اليوم الثاني الذي تم فيه العد × اليوم الثاني من بداية العد

100×(.....

نسبة الانبات TG

حسب (Radford et al ; 1968) تم حساب قوة نشاط البذور ، مؤشر توتر الانبات
مؤشر توتر المادة الجافة ، و مؤشر توتر الملوحة وفق المعادلات التالية :

3-5 قوة نشاط البذور (SV) Seed Vigor :

SV = نسبة الانبات × متوسط طول (سويقة + جذير)

4-5 مؤشر توتر الانبات (GSI) Stress Index Germination :

% GSI= PI of stressed seeds× 100

PI control seeds

حيث : PI تمثل

nd2(1)+nd4(0.75)+nd 6(0.5)+nd8(0.25)

و nd2 تمثل البذور المنبته في اليوم الثاني ،

5-5 مؤشر توتر المادة الجافة (DMSI) Dry Matter Stressed Index :

$$\text{DMSI \%} = \frac{\text{الوزن الجاف للعينه (سويقة + جذر)}}{\text{الوزن الجاف للشاهد (سويقة + جذر)}}$$

5-6 مؤشر توتر الملوحة (STI) Salt Tolerance Index :

$$\text{ITS \%} = \frac{\text{طول العينه (سويقة + جذر)}}{\text{الطول للشاهد العام (سويقة + جذر)}}$$

5-7 طول البادرة :

اخذت ثلاث اول بادرات انتشت في كل طبق وكل تكرار وتم قياس اطوالها ب cm وذلك باستخدام مسطرة ,

الفصل الثاني

النتائج والمناقشة

1- النتائج :**1-1-دراسة تأثير الملوحة :****1-1-1- نسبة الانبات :**

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (9) نلاحظ وجود اختلافات في نسبة الانبات باختلاف تراكيز الملوحة ،كما بينت النتائج وجود اختلافات معنوية بين S4 وباقي التراكيز ما عدا S5 في حين يختلف S5 معنويا عن باقي التراكيز ما عدى S3 مع ملاحظة عدم وجود فروق معنوية بين S0 وS1 وكذلك تبين النتائج ان التركيزين S0 وS1 لم يكن لها تاثير سلبي واضح وكانت نسبة الانبات 100% في حين قلت نسبة الانبات الى 73,75% في التركيز S2 وفي S3 , S4 , S5 تكون نسبة الانبات 28,75% ، 0% ، 12,50% على التوالي .

جدول (9):الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على نسبة الانبات

Category	LS means	Groups			
S4	0,00	A			
S5	12,50	A	B		
S3	28,75		B		
S2	73,75			C	
S1	100,00				D
S0	100,00				D

1-1-2- سرعة الانبات :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (10) نلاحظ وجود اختلافات في سرعة الانبات باختلاف تراكيز الملوحة، كما بينت النتائج عدم وجود اختلافات معنوية بين S4 وباقي التراكيز ما عدا S2 و S3، في حين لا توجد اختلافات معنوية مقارنة مع S0 و S1 و S5، كما بينت النتائج عدم وجود الفروقات المعنوية في سرعة الانبات بين S1 و S2 و S3 و S2 و S3 بحيث سجلت اقل سرعة للنبات عند التركيز S4 واعلاها عند التركيز S3 كانت 0,65

جدول (10): الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على سرعة الانبات

Category	LS means	Groups		
S4	0,00	A		
S0	0,22	A		
S5	0,29	A	B	
S1	0,29	A	B	
S2	0,58		B	C
S3	0,65			C

1-1-3- قوة نشاط البذور :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (11) نلاحظ وجود اختلافات في قوة نشاط البذور باختلاف تراكيز الملوحة ، بينت النتائج عدم وجود اختلافات معنوية بين S4 وباقي التراكيز (S3,S2,S5) ما عدا S0 و S1 ، كما يتوضح لنا ايضا وجود فروق معنوية بين التركيز S0 و S1 كذلك تبين لنا النتائج ان الوسط S0 على قوة نشاط البذور حيث كانت تساوي 909,58 في حين قلت في التركيز S1 لتصل الى 325,58.

جدول (11): الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على قوة نشاط البذور

Category	LS means	Groups		
S4	0,00	A		
S3	14,03	A		
S2	93,69	A		
S5	99,96	A		
S1	325,08		B	
S0	909,58			C

1-1-4- مؤشر توتر الانبات :

من خلال نتائج الجدول (12) نلاحظ وجود اختلافات في مؤشر توتر الانبات باختلاف تراكيز الملوحة ، بينت لنا عدم وجود اختلافات معنوية بين S4 وباقي التراكيز ما عدا S2 و S1 ، كما نلاحظ عدم وجود اختلافات معنوية بين S2 و التراكيز S3,S0,S1 حيث نجد 0,91 في التركيز S2 في حين قلت في التراكيز S1, S0, S3 حيث وجدت 0,87 ، 0,75 ، 0,27 على التوالي .

جدول (12): الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على مؤشر توتر الانبات

Category	LS means	Groups	
S4	0,00	A	
S5	0,00	A	
S3	0,27	A	B
S0	0,75	A	B
S1	0,87		B
S2	0,91		B

1-1-5- مؤشر توتر المادة الجافة :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (13) نلاحظ عدم وجود اختلافات في مؤشر توتر المادة الجافة باختلاف التراكيز ، حيث كان مؤشر توتر المادة الجافة 1,44 في التركيز S2 في حين نقصت الى 0,97 و 0,91 و 0,37 في التركيز S1 , S0 , S3 على التوالي في حين انعدمت في التركيزين S4 و S5.

جدول (13): الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير الملوحة على مؤشر توتر المادة الجافة

Category	LS means	Groups
S4	0,00	A
S5	0,00	A
S3	0,37	A
S0	0,91	A
S1	0,97	A
S2	1,44	A

1-1-6- مؤشر توتر الملوحة :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (14) نلاحظ وجود اختلافات في مؤشر توتر الملوحة باختلاف تراكيز الملوحة ،حيث بينت لنا النتائج وجود اختلافات معنوية بين S0 وباقي التراكيز ما عدا S1 و S2 كما نلاحظ عدم وجود فروق معنوية بين S2 وباقي التراكيز ، كما كان مؤشر توتر الملوحة 1,17 في التركيز S0 في حين قلت في التركيز S1 لتصل الى 1,12 كما نجد 0,70 و 0,39 في التراكيز S2 و S3 على التوالي حتى تنعدم في التركيزين S4 و S5.

جدول (14): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الملوحة على مؤشر توتر الملوحة

Category	LS means	Groups		
S4	0,00	A		
S5	0,00	A		
S3	0,39	A	B	
S2	0,70	A	B	C
S1	1,12		B	C
S0	1,17			C

2-1-دراسة تأثير الاصناف :

1-2-1 نسبة الانبات :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (15) نلاحظ وجود اختلافات معنوية في نسبة الانبات باختلاف الاصناف ، بينت النتائج ان الصنف V7 كانت نسبة انباته عالية مقارنة بV4 حيث كانت 58,47% بالمقابل 46,53% عند الصنف V4.

جدول (15): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الاصناف على نسبة الانبات

Category	LS means	Groups	
V4	46,53	A	
V7	58,47		B

2-2-1- سرعة الانبات :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (16) نلاحظ عدم وجود فروق معنوية في سرعة الانبات باختلاف الاصناف ، حيث كانت سرعة الانبات 0,34 في كلا الصنفين (V4-V7)

جدول (16): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الأصناف على سرعة الإنبات

Category	LS means	Groups
V4	0,34	A
V7	0,34	A

1-2-3- قوة نشاط البذور :

بالاعتماد على النتائج الموضحة في الجدول (17) نلاحظ عدم وجود فروق معنوية في قوة نشاط البذور باختلاف الاصناف ، حيث قدرت قوة نشاط البذور ب256,10 عند الصنف V7 في حين قلت الى 224,68 عند الصنف V4

جدول (17): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الاصناف على قوة نشاط البذور

Category	LS means	Groups\
V4	224,68	A
V7	256,10	A

1-2-4- مؤشر توتر الانبات :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (18) نلاحظ عدم وجود فروق معنوية في مؤشر توتر الانبات باختلاف الاصناف ، تبين لنا النتائج ان مؤشر توتر الانبات قدرب0,60 في الصنف V4 في حين نجد 0,33 في الصنف V7 .

جدول (18): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الاصناف على مؤشر توتر الانبات

Category	LS means	Groups
V7	0,33	A
V4	0,60	A

1-2-5- مؤشر توتر المادة الجافة :

من خلال نتائج الجدول (19) نلاحظ عدم وجود فروق معنوية في مؤشر توتر المادة الجافة باختلاف الاصناف ، حيث في الصنف V7 كان مؤشر التوتر 0,67 بالمقابل نجد 0,55 عند الصنف V4.

جدول (19): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الاصناف على مؤشر توتر المادة الجافة

Category	LS means	Groups
V4	0,55	A
V7	0,67	A

1-2-6- مؤشر توتر الملوحة:

اعتمادا على الجدول (20) نلاحظ عدم وجود فروق معنوية في مؤشر توتر الملوحة باختلاف الاصناف ، حيث عند الصنف V7 قدر ب 0,64 بالمقابل في الصنف V4 قدر ب 0,49

جدول (20): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الاصناف على مؤشر توتر الملوحة

Category	LS means	Groups
V4	0,49	A
V7	0,64	A

3-1-دراسة تأثير الهرمون :

1-3-1-نسبة الانبات

اعتمادا على الجدول (21) نلاحظ عدم وجود فرق معنوي في نسبة الانبات في وجود وغياب هرمون الجبريلين GA3 ، حيث كانت نسبة انبات البذور في وجود الهرمون 53,33% وفي غيابه 51,67% .

جدول (21): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الهرمون على نسبة الانبات

Category	LS means	Groups
G0	51,67	A
G1	53,33	A

1-3-2- سرعة الانبات

انطلاقاً من الجدول (22) نلاحظ عدم وجود اختلاف معنوي في سرعة الانبات في وجود هرمون الجبريلين وغيابه حيث نلاحظ تفوق سرعة انبات البذور في وجود الجبريلين حيث قدرت ب0,38 ، اما في غيابه انخفضت سرعة انبات البذور الى 0,29 .

جدول (22): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الهرمون على سرعة الانبات

Category	LS means	Groups
G0	0,29	A
G1	0,38	A

1-3-3- قوة نشاط البذور

انطلاقاً من الجدول (23) نلاحظ عدم وجود فروق معنوية في قوة نشاط البذور وذلك في وجود وغياب هرمون الجبريلين ،حيث قدرت قوة نشاط البذور 252,69 في غياب الهرمون في حين نجد في وجوده 228,09.

جدول (23): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير الهرمون على قوة نشاط البذور

Category	LS means	Groups
G1	228,09	A
G0	252,69	A

1-4-4-دراسة تاثير التداخل بين الملوحة و الهرمون :

1-4-1-نسبة الانبات:

انطلاقا من الجدول(24) نلاحظ وجود اختلافات في نسبة الانبات باختلاف تراكيز الملوحة وذلك في وجود وغياب الهرمون ،حيث نلاحظ عدم وجود فروق معنوية بين S0 وS1 في وجود وغياب هرمون الجبريلين ،كما تبين لنا عدم وجود فروق معنوية بين S4 وS5 وS3 في وجود وغياب هرمون الجبريلين ، كما كانت نسبة انبات S0 وS1 100% في حين قلت الى %77,50 في التركيز S2 وذلك اثناء غياب الهرمون بالمقابل في وجوده نجد %70 اما في التركيز S3 في وجود الهرمون سجلت %30,83 اما في غيابه %26,67 وتتناقص هذه النسبة حتى تنعدم في التركيز S4 .

جدول (24) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير التداخل بين الملوحة والهرمون على نسبة الانبات

Category	LS means	Groups		
G0*S4	0,00	A		
G1*S4	0,00	A		
G0*S5	5,83	A		
G1*S5	19,17	A		
G0*S3	26,67	A		
G1*S3	30,83	A	B	
G1*S2	70,00		B	C
G0*S2	77,50			C
G1*S1	100,00			C
G0*S1	100,00			C
G0*S0	100,00			C
G1*S0	100,00			C

1-4-2- سرعة الانبات :

انطلاقا من الجدول (25) نلاحظ وجود اختلافات في سرعة الانبات باختلاف التراكيز في وجود وغياب هرمون الجبريلين ،تبين لنا عدم وجود فروق معنوية بين S4 وباقي التراكيز (S5, S1,S4, S0) في وجود هرمون الجبريلين وغيابه وكذلك في S3 في غياب الهرمون، كما نلاحظ عدم وجود فروق معنوية بين S3 وباقي التراكيز ما عدا S2 في وجود الهرمون

وغيابه وفي S5 في وجود الجبريلين وفي S1 في غيابه. بحيث سجلت اقل سرعة للانبات عند التركيز S4 في وجود وغياب الجبريلين واعلاها عند التركيز S3 في وجود الجبريلين

جدول (25): الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الهرمون و الملوحة على سرعة الانبات

Category	LS means	Groups		
G0*S4	0,00	A		
G1*S4	0,00	A		
G0*S5	0,20	A	B	
G0*S0	0,21	A	B	
G1*S0	0,22	A	B	
G1*S1	0,28	A	B	
G0*S1	0,30	A	B	C
G1*S5	0,38	A	B	C
G0*S3	0,46	A	B	C
G1*S2	0,58		B	C
G0*S2	0,59		B	C
G1*S3	0,85			C

1-4-3- قوة نشاط البذور

انطلاقا من النتائج الموضحة في الجدول (26) نلاحظ وجود اختلافات في قوة نشاط البذور باختلاف تراكيز الملوحة وذلك في وجود وغياب الهرمون ، حيث نلاحظ وجود فروق معنوية بين S0 في وجود وغياب هرمون الجبريلين وباقي التراكيز حيث كانت قوة نشاط

البذور في وجود الجبريلين 978,50 في حين قلت هذه القيمة في غياب الجبريلين الى 840,67. كما يختلف S1 معنويا في وجود وغياب الجبريلين عن باقي التراكيز ما عدى التركيز S2 في غياب الجبريلين و التركيز S5 في غياب الجبريلين .

جدول (26): الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الهرمون و الملوحة على قوة

نشاط البذور

Category	LS means	Groups		
G0*S4	0,00	A		
G1*S4	0,00	A		
G1*S3	13,72	A		
G0*S3	14,33	A		
G1*S5	30,75	A		
G1*S2	65,59	A		
G0*S2	121,79	A	B	
G0*S5	169,17	A	B	
G1*S1	280,00	A	B	
G0*S1	370,17		B	
G0*S0	840,67			C
G1*S0	978,50			C

1-5-1-دراسة تأثير التداخل بين الملوحة و الاصناف:

1-5-1-نسبة الانبات:

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (27) نلاحظ وجود اختلافات في نسبة الانبات باختلاف تراكيز الملوحة و الاصناف ، بينت لنا النتائج عدم وجود فروق معنوية

عند S0 و S1 و S2 لكلا الصنفين , كذلك تبين لنا ان نسبة الانبات في S0 و S1 كانت 100% في حين قلت النسبة الى 80,83% للصنف V7 اما الصنف V4 كانت النسبة 66,67% كما سجلت اقل نسبة للنبات عند التركيز S4 لكلا الصنفين .

جدول (27) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على نسبة الانبات

Category	LS means	Groups			
V7*S4	0,00	A			
V4*S4	0,00	A			
V4*S5	5,83	A			
V4*S3	6,67	A			
V7*S5	19,17	A	B		
V7*S3	50,83		B	C	
V4*S2	66,67			C	D
V7*S2	80,83			C	D
V4*S1	100,00				D
V7*S1	100,00				D
V4*S0	100,00				D
V7*S0	100,00				D

1-5-2- سرعة الانبات

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (28) نلاحظ وجود اختلافات في سرعة الانبات باختلاف تراكيز الملوحة لكلا الصنفين (V4-V7)، حيث نلاحظ عدم وجود اختلاف معنوي في التركيز S4 لكلا الصنفين مع باقي التراكيز ماعدا S3 للصنف V7 والتركيز

S2 للصف V4 كما سجلت اقل سرعة للانبات عند التركيز S4 لكلا الصنفين واعلاها في التركيز S3 للصف V7 .

جدول (28) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على سرعة الانبات

Category	LS means	Groups		
V4* S4	0,00	A		
V7* S4	0,00	A		
V4* S5	0,20	A	B	
V7* S0	0,21	A	B	
V7* S1	0,21	A	B	
V4* S0	0,23	A	B	C
V4* S1	0,37	A	B	C
V7* S5	0,38	A	B	C
V7* S2	0,49	A	B	C
V4* S3	0,53	A	B	C
V4* S2	0,68		B	C
V7* S3	0,77			C

1-5-3- قوة نشاط البذور :

بالاعتماد على النتائج الموضحة في الجدول (29) نلاحظ وجود اختلافات في قوة نشاط البذور باختلاف تراكيز الملوحة مقارنة بالصنفين ، بينت لنا النتائج عدم وجود اختلافات معنوية بين S4 للصنفين وباقي التراكيز ما عدا S0 لكلا الصنفين و S1 في V7، في حين نجد عدم وجود فروق معنوية بين S0 في كلا الصنفين كذلك تبين لنا النتائج

ان قوة نشاط البذور 999 كانت في الصنف V7 بينما قلت الى 820,17 للصنف V4 ، حتى تتعدم في S4 لكلا الصنفين .

جدول (29) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على قوة نشاط البذور

Category	LS means	Groups		
V4* S4	0,00	A		
V7* S4	0,00	A		
V4* S3	1,72	A		
V7* S3	26,33	A		
V7* S5	30,75	A		
V7* S2	73,49	A		
V4* S2	113,89	A	B	
V4* S5	169,17	A	B	
V4* S1	243,17	A	B	
V7* S1	407,00		B	
V4* S0	820,17			C
V7* S0	999,00			C

1-5-4- مؤشر توتر الانبات :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (30) نلاحظ وجود اختلافات في قوة نشاط البذور باختلاف تراكيز الملوحة مقارنة بالصنفين ، بينت النتائج عدم وجود اختلافات معنوية بين S4 لكلا الصنفين مع باقي التراكيز ما عدا S0 للصنف V4، كما نلاحظ عدم وجود فروق معنوية بين التراكيز S5 و S4 للصنفين والتركيز S0 في الصنف V7 كما كان مؤشر

توتر الانبات 1,50 في التركيز S0 للصف V4 بالمقابل نجدها منعدمة في الصف V7 في حين تتخض في التركيز S1 لتصل الى 1,23 في V4 .

جدول(30) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على مؤشر توتر الانبات

Category	LS means	Groups	
V4*S4	0,00	A	
V4*S5	0,00	A	
V7*S0	0,00	A	
V7*S4	0,00	A	
V7*S5	0,00	A	
V4*S3	0,22	A	B
V7*S3	0,32	A	B
V7*S1	0,50	A	B
V4*S2	0,65	A	B
V7*S2	1,17	A	B
V4*S1	1,23	A	B
V4*S0	1,50		B

1-5-5- مؤشر توتر المادة الجافة :

بالاعتماد على النتائج الموضحة في الجدول(31) نلاحظ عدم وجود اختلافات معنوية بين تراكيز الملوحة لكلا الصنفين ،كما بينت النتائج في التركيز S2 للصف V7 كان مؤشر توتر المادة الجافة 1,63 في حين قلت عند الصف V4 لنفس التركيز الى 1,24 كما انه يتناقص حتى ينعدم في التركيزين S4 و S5.

جدول (31) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على مؤشر توتر المادة الجافة

Category	LS means	Groups
V4*S4	0,00	A
V4*S5	0,00	A
V7*S4	0,00	A
V7*S5	0,00	A
V4*S3	0,24	A
V7*S3	0,51	A
V4*S0	0,86	A
V7*S1	0,94	A
V7*S0	0,95	A
V4*S1	0,99	A
V4*S2	1,24	A
V7*S2	1,63	A

1-5-6- مؤشر توتر الملوحة:

بالاعتماد على النتائج الموضحة في الجدول (32) ، نلاحظ عدم وجود اختلافات معنوية بين تراكيز الملوحة لكلا الصنفين ، حيث سجلت اعلى نسبة عند V4 في التركيز S0 مقدرة ب 1.23 وسجلت اقل نسبة عند كل من S4 S5 لكلا الصنفين مقدرة ب 0,20 بالاضافة الى ذلك نجد في التراكيز S1 و S2 و S3 للصف V7 كان مؤشر توتر الملوحة يتراوح من 1,10 الى 9,57

بينما في الصنف V4 وفي الاوساط S2 و S3 كانت تتراوح من 0,31 الى 0,22 حتى تتعدم في S4 و S5.

جدول (32) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الملوحة والاصناف على مؤشر توتر المادة الملوحة

Category	LS means	Groups
V4*S4	0,00	A
V4*S5	0,00	A
V7*S4	0,00	A
V7*S5	0,00	A
V4*S3	0,22	A
V4*S2	0,31	A
V7*S3	0,57	A
V7*S1	1,03	A
V7*S2	1,10	A
V7*S0	1,11	A
V4*S1	1,20	A
V4*S0	1,23	A

1-6-دراسة تأثير التداخل بين الاصناف و الهرمونات :

1-6-1-نسبة الانبات :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (33) نلاحظ وجود اختلافات في نسبة الانبات باختلاف الاصناف في وجود وغياب هرمون الجبريلين ، بينت وجود اختلافات معنوية بين الصنف V4 و V7 في وجود الجبريلين ما عدا غياب هرمون الجبريلين في

كلا الصنفين ، كذلك تبين لنا النتائج ان نسبة الانبات اعلاها سجلت في الصنف V7 63,06% في حين قلت هذه النسبة في غياب الهرمون % 53,89 ، كما نجد في الصنف V4 كانت نسبة انباته عالية في وجود الهرمون مقارنة بغيابه حيث كانت النسبة % 49,44 بينما في وجود الجبريلين 43,61 %.

جدول (33) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتاثير التداخل بين الاصناف و الهرمونات على نسبة الانبات

Category	LS means	Groups	
G1*V4	43,61	A	
G0*V4	49,44	A	B
G0*V7	53,89	A	B
G1*V7	63,06		B

1-6-2- سرعة الانبات :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (34) نلاحظ عدم وجود اختلافات معنوية في سرعة الانبات باختلاف الاصناف في وجود وغياب هرمون الجبريلين ، ، كذلك تبين لنا النتائج ان سرعة الانبات كانت 0,41 في الصنف V7 في وجود هرمون الجبريلين بينما في غيابه كانت السرعة 0,27 ، اما في الصنف V4 كانت سرعة انباته 0,36 في وجود الهرمون مقارنة بغيابه 0,31. وعليه نجد ان الصنف V7 كانت سرعة انباته اعلى في وجود الهرمون.

جدول (34) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمونات على سرعة الانبات

Category	LS means	Groups
G0*V7	0,27	A
G0*V4	0,31	A
G1*V4	0,36	A
G1*V7	0,41	A

1-6-3- قوة نشاط البذور :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (35) نلاحظ عدم وجود اختلافات معنوية في قوة نشاط البذور باختلاف الاصناف في وجود وغياب هرمون الجبريلين ،تبين لنا النتائج ان قوة نشاط البذور كانت 269,57 للصف 7 في وجود الهرمون مقارنة بغيابه حيث قدرت ب242,63بينما كانت 186,62 في الصف 4 وذلك في وجود الهرمون بينما في غيابه نجد 262,75.

جدول (35) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمونات على قوة نشاط البذور

Category	LS means	Groups
G1*V4	186,62	A
G0*V7	242,63	A
G0*V4	262,75	A
G1*V7	269,57	A

7-1-دراسة تأثير التداخل بين الهرمون و الملوحة و الاصناف :

1-7-1-نسبة الانبات:

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (36) نلاحظ وجود اختلافات في نسبة الانبات باختلاف تراكيز الملوحة و الاصناف في وجود وغياب هرمون الجبريلين ، بينت النتائج وجود اختلافات معنوية بين S4 وباقي التراكيز ما عدا S3 و S5 للصفين V4 و V7 في وجود وغياب الهرمون و S2 في الصنف V4 في وجود الجبريلين ، كما نلاحظ عدم وجود فروق معنوي بين S0 و S1 في كلا الصفين V4 و V7 في وجود وغياب هرمون الجبريلين، وكذلك تبين لنا النتائج ان نسبة الانبات كانت 100% في التركيزين S1 و S0 ، في حين قلت نسبة الانبات في S2 لكلا الصفين حيث كانت نسبة الانبات 90% في V7 في وجود الجبريلين بالمقابل نجدها في الصنف V4 كانت 50% ، اما في غياب الهرمون نجدها 71,67% مقارنة بالصنف V4 كانت النسبة 83,33% وتتاقص النسبة تدريجيا كلما زادت الملوحة وفي غياب الهرمون حتى تنعدم في S4 و S5.

جدول (36): الفروقات المعنوية للمجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمون و

الملوحة على نسبة الانبات

Category	LS means	Groups		
G0*V7*S4	0,00	A		
G0*V4*S4	0,00	A		
G1*V4*S4	0,00	A		
G1*V7*S4	0,00	A		
G0*V7*S5	0,00	A		
G1*V4*S5	0,00	A		
G0*V4*S3	1,67	A		

G0*V4*S5	11,67	A	B	
G1*V4*S3	11,67	A	B	
G1*V7*S5	38,33	A	B	C
G1*V4*S2	50,00	A	B	C
G1*V7*S3	50,00	A	B	C
G0*V7*S3	51,67	A	B	C
G0*V7*S2	71,67		B	C
G0*V4*S2	83,33			C
G1*V7*S2	90,00			C
G1*V4*S1	100,00			C
G0*V7*S1	100,00			C
G0*V7*S0	100,00			C
G1*V4*S0	100,00			C
G0*V4*S1	100,00			C
G1*V7*S1	100,00			C
G0*V4*S0	100,00			C
G1*V7*S0	100,00			C

1-7-2- سرعة الانبات :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (37) نلاحظ وجود اختلافات في سرعة الانبات باختلاف تراكيز الملوحة و الاصناف في وجود وغياب هرمون الجبريلين، كما نلاحظ عدم وجود اختلافات معنوية بين التركيز S4 وباقي التراكيز لكلا الصنفين في وجود الهرمون وغيابه ما عدا الوسط S3 للصنف V7 في وجود الجبريلين ، كما نلاحظ ان سرعة الانبات كانت 0,89 في التركيز S3 للصنف V7 في وجود هرمون الجبريلين

بالمقابل نجد سرعة الانبات الى 0,80 في الصنف V4 في نفس التركيز في وجود الهرمون وانعدام سرعة الانبات في التركيزين S4 و S5 لكلا الصنف في وجود وغياب الهرمون .

جدول (37) : الفروقات المعنوية والمجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمون و

الملوحة على سرعة الانبات

Category	LS means	Groups	
G0*V7*S4	0,00	A	
G1*V4*S4	0,00	A	
G0*V4*S4	0,00	A	
G1*V7*S4	0,00	A	
G1*V4*S5	0,00	A	
G0*V7*S5	0,00	A	
G0*V7*S0	0,20	A	B
G0*V7*S1	0,21	A	B
G1*V7*S0	0,21	A	B
G1*V7*S1	0,21	A	B
G0*V4*S0	0,22	A	B
G1*V4*S0	0,23	A	B
G0*V4*S3	0,27	A	B
G1*V4*S1	0,35	A	B
G1*V7*S2	0,39	A	B
G0*V4*S1	0,40	A	B
G0*V4*S5	0,40	A	B
G0*V7*S2	0,58	A	B

G0*V4*S2	0,59	A	B
G0*V7*S3	0,64	A	B
G1*V7*S5	0,76	A	B
G1*V4*S2	0,77	A	B
G1*V4*S3	0,80	A	B
G1*V7*S3	0,89		B

1-7-3- قوة نشاط البذور :

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (38) نلاحظ وجود اختلافات في قوة نشاط البذور باختلاف تراكيز الملوحة و الاصناف في وجود وغياب هرمون الجبريلين، نلاحظ عدم وجود اختلافات معنوية بين الوسط S4 وباقي الاوساط لكلا الصنفين في وجود الهرمون وغيابه ما عدا S0 لكلا الصنفين في وجود الهرمون وغيابه، كما كانت قوة نشاط البذور 1054 في التركيز S0 للصنف V7 في وجود الجبريلين بينما في غيابه 944، بالمقابل نجد 903 في نفس الوسط وذلك عند الصنف V4 في وجود الجبريلين بينما في غيابه 737,33 كما انعدمت هذه القوة في التركيز S4 لكلا الصنفين والتركيز S5 في الصنف V4 وذلك في وجود الهرمون و الصنف V7 في غيابه .

جدول (38) : الفروقات المعنوية و المجموعات لتأثير التداخل بين الاصناف و الهرمون و الملوحة على قوة نشاط البذور

Category	LS means	Groups			
G0*V7*S4	0,00	A			
G0*V4*S4	0,00	A			
G1*V4*S4	0,00	A			

G1*V7*S4	0,00	A			
G0*V7*S5	0,00	A			
G1*V4*S5	0,00	A			
G0*V4*S3	0,50	A			
G1*V4*S3	2,93	A			
G1*V7*S3	24,50	A			
G0*V7*S3	28,17	A			
G1*V4*S2	40,12	A			
G0*V7*S2	55,92	A			
G1*V7*S5	61,50	A			
G1*V7*S2	91,07	A			
G1*V4*S1	173,67	A			
G0*V4*S2	187,67	A			
G0*V4*S1	312,67	A	B		
G0*V4*S5	338,33	A	B		
G1*V7*S1	386,33	A	B		
G0*V7*S1	427,67	A	B	C	
G0*V4*S0	737,33		B	C	D
G1*V4*S0	903,00			C	D
G0*V7*S0	944,00				D
G1*V7*S0	1054,00				D

1-8-1- معدل طول البادرة:

1-8-1-1- للصف V4 :

الوثيقة (16): تبين نتائج تأثير الملوحة على صفة معدل طول البادرة عند الصف

(V4)Q18 في وجود وغياب هرمون الجبرلين

من خلال الوثيقة (16) التي تبين تأثير الملوحة على صفة طول البادرات للصف V4 وذلك في وجود هرمون الجبرلين و غيابه يتبين لنا ان الملوحة اثرت سلبا على صفة طول البادرة في التراكيز من S1 الى S5 مقارنة بالشاهد S0 ، اما الاستجابة لمنظم النمو الجبرلين لم تكن واضحة الا في المستوى S0 ، كما شوهد تراجع في معدل طول البادرة عند S1 في وجود وغياب هرمون الجبرلين مقارنة بالتركيز S0، حيث قدر في وجود الجبرلين 2,13 وفي غيابه 3,12 cm ، اما في S0 فنجد معدل طول البادرة في وجود الهرمون 9,02cm اما في غيابه 7,73 cm كما شوهد ايضا انخفاض شديد في معدل طول البادرة في التراكيز S2 و S3 حتى ينعدم في S4 وذلك اثناء وجود الهرمون وغيابه، حيث في التركيز S2 قدر معدل طول البادرة في وجود الجبرلين 0,65 cm اما في غيابه ب 2,22 cm ، وفي التركيز S3 كان 0,153 cm في وجود هرمون الجبرلين اما في غيابه

0,1 cm. اما في التركيز S5 قدر طول البادرة 0.096cm في غياب الجبريلين بينما انعدم في وجوده ، تبين لنا من خلال النتائج انخفاض في معدل طول البادرة كلما زادت تراكيز الملوحة في وجود هرمون الجبريلين وغيابه .

1-8-2-2-1-8-1 : V7 للسنف

الوثيقة (17): تبين نتائج تأثير الملوحة على صفة طول البادرات للسنف Q27 (V7)

من خلال الوثيقة (17) التي تبين تأثير الملوحة على صفة طول البادرات للسنف V7 وذلك في وجود هرمون الجبريلين وغيابه . يتبين لنا ان الملوحة اثرت سلبا على صفة طول البادرة في التراكيز من S1 الى S5 مقارنة بالشاهد S0 ، اما الاستجابة لمنظم النمو الجبريلين لم تكن واضحة الا في المستوى S0 ، حيث شوهد تراجع في معدل طول البادرة عند S1 في وجود وغياب هرمون الجبريلين مقارنة بالتركيز S0 ، حيث قدر طول البادرة في وجود الجبريلين 3,86 cm وفي غيابه 4,72 cm ، اما في S0 فنجد معدل طول البادرة في وجود الهرمون 10,45 cm اما في غيابه 9,44 cm كما شوهد ايضا انخفاض شديد في معدل طول البادرة في التراكيز S2 و S3 و S5 حتى ينعدم في S4 وذلك اثناء وجود الهرمون وغيابه وفي S5 في غيابه ، حيث في التركيز S2 قدر معدل طول البادرة

في وجود الجبريلين بـ 0,99 cm بينما انخفضت في غيابه 0,73 cm، وفي التركيز S3 كان 0,4 cm في وجود الهرمون اما في غيابه 0,63 cm.

1-9-1- الوزن الطري :

1-9-1-1- للصنف V4 :

الوثيقة (18): تبين نتائج تأثير الملوحة على الوزن الطري للصنف Q18 (v4) في وجود وغياب هرمون الجبريلين

من خلال الوثيقة (18) التي تبين تأثير الملوحة على الوزن الطري للبادرة للصنف V4 في وجود الهرمون و غيابه . يتبين لنا ان الملوحة اثرت سلبا على الوزن الطري للبادرة في التراكيز من S1 الى S5 مقارنة بالشاهد S0 ،اما الاستجابة لمنظم النمو الجبريلين لم تكن واضحة الا في المستوى S3 ،حيث شوهد تراجع في الوزن الطري عند التركيز S1 وذلك في وجود و غياب الهرمون مقارنة بالتركيز S0 حيث قدر الوزن الطري في وجود الجبريلين 21,01 mg اما في غيابه 23 mg بينما نجد في التركيز S0 في غياب الجبريلين 51,80mg اما في وجود الهرمون نجد انخفاض في الوزن الطري حيث قدر بـ 33,26 mg، كما تبين لنا انخفاض شديد في كلا التركيزين S2 و S3 مقارنة بـ S1 و S0

بينما نلاحظ انعدامه في التركيز S4 في وجود الجبريلين و غيابه و التركيز S5 في وجود الهرمون ، كما نلاحظ زيادة نسبية في التركيز S2 وذلك في غياب الجبريلين حيث نجد 6,22 mg اما في وجود الهرمون فكانت 2,86 mg ، كما نلاحظ في التركيز S3 ارتفاع معتبر في الوزن الطري للبادرة وذلك في وجود الجبريلين حيث قدر ب 6,56 mg اما في غيابه نجد 3,5 mg ، اما بالنسبة للتركيز S5 كان الوزن الطري في غياب الجبريلين يقدر ب 2,15 mg بينما انعدم في غيابه .

1-9-2- للصف v7 :

الوثيقة (19) : تبين النتائج تأثير الملوحة على الوزن الطري عند الصف v7 (Q27) في وجود وغياب هرمون الجبريلين

من خلال الوثيقة (19) التي تبين تأثير الملوحة على الوزن الطري للبادرة للصف v7 في وجود الهرمون و غيابه. يتبين لنا ان الملوحة اثرت سلبا على الوزن الطري للبادرة في التراكيز من S1 الى S5 مقارنة بالشاهد S0 ، اما الاستجابة لمنظم النمو الجبريلين لم تكن واضحة الا في المستوى S0 و S3 و S5 ، كما نلاحظ تراجع في الوزن الطري عند التركيز S1 مقارنة بالتركيز S0 وذلك في وجود و غياب الهرمون، حيث قدر الوزن الطري

في وجود الجبريلين 19,49mg اما في غيابه 23,54 mg بينما نجد في التركيز S0 في وجود الجبريلين 34,06mg اما في غيابه نجد انخفاض طفيف في الوزن الطري حيث قدر بـ 33,18 mg ، كما تبين لنا انخفاض شديد في كلا التركيزين S2 و S3 مقارنة بـ S0 و S1 بينما نلاحظ انعدامه في التركيز S4 في وجود الجبريلين و غيابه والتركيز S5 في غيابه ، كما نلاحظ زيادة نسبية في التركيز S2 وذلك في غياب الجبريلين حيث نجد 12,68 mg اما في وجود الهرمون 9,3mg كما نلاحظ في التركيز S3 ارتفاع معتبر في الوزن الطري للبادرة وذلك في وجود الجبريلين حيث قدر بـ 12,85 mg اما في غيابه نجد 7,85 mg . اما بالنسبة للتركيز S5 كان الوزن الطري في وجود الجبريلين يقدر بـ 5,55mg بينما انعدم في غيابه .

10-1-الوزن الجاف :

1-10-1-للمصنف v4 :

الوثيقة (20) : تبين نتائج تأثير الملوحة على الوزن الجاف للمصنف (V4) Q18

من خلال الوثيقة (20) التي تبين تأثير الملوحة على الوزن الجاف للبادرة للمصنف

V4 في وجود الهرمون و غيابه . يتبين لنا ان الملوحة اثرت سلبا على الوزن الجاف للبادرة

في التراكيز من S1 الى S5 مقارنة بالشاهد S0 ،اما الاستجابة لمنظم النمو الجبريلين لم تكن واضحة الا في المستوى S3 ، نلاحظ تراجع طفيف في الوزن الجاف عند التركيز S1 مقارنة بالتركيز S0 وذلك في وجود و غياب الهرمون، حيث قدر الوزن الجاف في وجود الجبريلين 20,15 mg اما في غيابه 20,25 mg بينما نجد في التركيز S0 في وجود الجبريلين 23,76mg اما في غيابه نجد 27,71 mg ، كما تبين لنا انخفاض شديد للوزن الجاف في كلا التركيزين S2 و S3 مقارنة ب S1 و S0 بينما نلاحظ انعدامه في التركيز S4 في وجود الجبريلين و غيابه ، كما نلاحظ ايضا تساوي تقريبا في التركيز S2 وذلك في غياب الجبريلين حيث نجد 4,15 mg اما في وجود الهرمون 4, كما نجد في التركيز S3 ارتفاع معتبر في الوزن الجاف للبادرة وذلك في وجود الجبريلين حيث قدر ب 6,43 mg اما في غيابه نجد 3,03 mg ، اما بالنسبة للتركيز S5 كان الوزن الجاف في غياب الجبريلين يقدر ب 1,73mg بينما انعدم في وجوده.

: v7-2-10-1-الصف v7 :

الوثيقة (21) : تبين نتائج تأثير الملوحة على الوزن الجاف للصف Q27 (V7) في وجود وغياب هرمون الجبريلين

من خلال الوثيقة (21) التي تبين تأثير الملوحة على الوزن الجاف للبادرة للصف V7 في وجود هرمون الجبريلين و غيابه ، يتبين لنا ان الملوحة اثرت سلبا على الوزن الجاف للبادرة في التراكيز من S1 الى S5 مقارنة بالشاهد S0 ، اما الاستجابة لمنظم النمو الجبريلين لم تكن واضحة الا في S5 ، كما نلاحظ تراجع طفيف في الوزن الجاف عند التركيز S1 مقارنة بالتركيز S0 وذلك في وجود و غياب الهرمون، حيث قدر الوزن الجاف في وجود الجبريلين 18,83 mg اما في غيابه 19,66mg بينما نجد في التركيز S0 في وجود الجبريلين 22,2mg اما في غيابه نجد 23,05 mg ، كما تبين لنا انخفاض للوزن الجاف في كلا التركيزين S2 و S3 مقارنة ب S1 و S0 بينما نلاحظ انعدامه في التركيز S4 في وجود الجبريلين و غيابه والتركيز S5 في غيابه ، كما نلاحظ زيادة نسبية في التركيز S2 وذلك في غياب الجبريلين حيث نجد 12,45mg اما في وجود الهرمون 8,46mg ، كما تبين في التركيز S3 ارتفاع معتبر في الوزن الجاف للبادرة وذلك في

غياب الجبريلين حيث قدر بـ 13,38 mg اما في وجوده نجد 2,46 mg ، اما بالنسبة للتركيز S5 كان الوزن الجاف في وجود الجبريلين يقدر بـ 3,23mg بينما انعدم في غيابه .

2- المناقشة

دراسة تأثير الملوحة و المعاملة بمنظم النمو GA3 على خصائص انبات بعض اصناف الكينوا و النامية في وسط ملحي .

اوضحت النتائج المتحصل عليها من خلال جداول الفروقات المعنوية و المجموعات بالاضافة الى المنحنيات لتأثير الملوحة على مرحلة انبات صنفين من بذور الكينوا (Q18-Q27) التي اعطت نسب متباينة و بدرجات مختلفة حسب تراكيز الملوحة في وجود وغياب هرمون الجبريلين، حيث تتناسب نسبة الانبات عكسيا مع زيادة تراكيز الملوحة أي كلما زادت تراكيز الملوحة قلت صفات الانبات ،كما ابدت نتائج متفاوتة بين الصنفين .

وهذا يتوافق مع ماجاء به (Chiraz et al ; 2011) وحسب (2011; Mouhammed et al) فان نسبة الانبات و سرعته تكون مرتفعة عند الشاهد ،وتتخفض بالمعاملات الملحية كلما زاد التركيز ، وهذا الانخفاض يدل على الحساسية المفرطة للملوحة ويعزى هذا النقص الى عدم قدرة البذور على الانبات بسبب تلف الاعضاء الجنينية وارتفاع ضغط محلول التربة الذي يعيق امتصاص البذور للماء (الشحات; 2000).

وفي دراسة اجراها (Seedi et al ; 2010) عن تأثير الملوحة في نسب انبات بذور نبات الماش اذ استعملت اربع تراكيز هي (50-100-150-200) mmol/l من ملح كلوريد الصوديوم وجد ان زيادة تراكيز الملوحة سببت خفضا في نسب انبات البذور (82-95-96-97)% على التوالي.

وفي دراسة قام بها (Ramoliya et al ; 2004) على بذور شجرة الاراك حيث سببت تراكيز الملوحة العالية تاخير الانبات على الرغم من ان هذه الشجرة تعد مقاومة للاملاح .

وهذا ما اكده (Mouhammad et al ; 2016) مرحلة الانبات من اشد المراحل حساسية للاملاح ،اذ تعمل الملوحة على تاخير الانبات أو فشله عند المستويات العالية من الملوحة .

كما تبين لنا من خلال النتائج ان مؤشر توتر الانبات ينخفض كلما زاد تركيز املاح كلوريد الصوديوم NaCl في الوسط وهذا يتفق مع النتائج التي توصل اليها (زغدي ومسعي 2019;) في دراسة انبات صنفين من القمح الصلب في ظروف الاجهاد الملحي ، وهذا يتفق مع دراسة (حرزولي و تليلي ; 2019) في دراسة تاثير هرمون الجبريلين و الملوحة على انبات صنفين من نبات الكينوا حيث ان نبات الكينوا اظهر توترا في مرحلة الانبات عند المعاملة بتراكيز الملوحة و هذا نجده عند كل البذور بنسب متفاوتة و التي تتاثر خلال مرحلة الانبات سواءا بالتراجع أو التثبيط .

تبين تراجع في قوة نشاط البذور عند كلا الصنفين بزيادة تراكيز الملوحة. وهذا راجع لوجود عاملين اساسيين هما :ان الملوحة تعمل على زيادة الضغط الاسموزي الخارجي الذي يعيق مرور الماء للوسط الداخلي للبذور ،أو يعود الى تراكم الايونات السامة Na^+ و Cl^- في الجنين ،وهذا التاثير السام قد يؤدي الى تثبيط عمل بعض البروتينات من ضمنها الانزيمات و بالتالي التغير في العمليات الايضية وفي الحالات القصوى تؤدي الى موت الجنين نتيجة للايونات الزائدة (Turhan et al ; 2011) .

اظهرت النتائج ان نسبة مؤشرات تحمل الملوحة تناقصت مع زيادة تراكيز املاح NaCl في الوسط عند صنف الكينوا Q18 و Q27 وتتفق هاته النتائج مع نتائج دراسة (زغدي ومسعي ; 2019) على انبات صنفين من القمح الصلب في ظروف الاجهاد الملحي حيث كلما زادت NaCl انخفضت نسبة تحمل الملوحة .

بينت النتائج المتحصل عليها على تأثير تركيز الملوحة والجبريلين على صفة مؤشر توتر المادة الجافة حيث لاحضنا ان مؤشر توتر المادة الجافة تأثر عند التراكيز العالية من

الملوحة مما يفسر ان الملوحة اثرت سلبا على الاوزان الجافة للبادرات ولو في وجود الجبريلين ، وهذا ماتوصل اليه (عيال و كريم; 2017) فقد لاحظ زيادة في النسب المئوية مع زيادة تراكيز الملوحة ويعود السبب في ذلك الى حدوث توازن بين الايونات السالبة والموجبة داخل الخلايا.

اما في مايخص طول البادرة لاحظنا تأثير الملوحة كان جد عال عند كلا الصنفين وهذا راجع الى عدم قدرة النبات على الامتصاص المائي ، وذكر (غروشة ; 2003) ان للملوحة تأثيرا سلبيا على معدل نمو الجذور نتيجة للعجز المعنوي في المحتوى المائي المتاح في الوسط الخلوي للخلايا النباتية ومحلول التربة الوسطية والمصحوب بزيادة التراكم الايوني لكل من الصديوم والكلوريد في الانسجة النباتية اذ ارجع هذا الى نقص امتصاص العناصر المعدنية .

بينما كانت نتائج اطوال البادرات عند الانواع المعاملة بالهرمون احسن من نتائج الانواع غير المعاملة .

تعد الكينوا من النباتات المتحملة للملوحة وتختلف درجة التحمل باختلاف الاصناف حيث لاحظنا في دراستنا ان الصنف Q27 اكثر تحمل من الصنف Q18 الا ان المستويات العالية من الملوحة تثبط نمو وانبات البذور في كلا الصنفين وهذا ملاحظناه عند التركيز S4 في كلا الصنفين حيث لم تنبت البذور أي انها اجهدت تماما وذلك لان التركيز فاق درجة تحملها للملوحة وهذا مايتوافق مع الدراسة التي قام بها (طويل و شرائطة ; 2018) حول تأثير الاجهادات الملحية في خصائص انبات بذور بعض اصناف الكينوا حيث اظهرت النتائج ان هناك اختلافات في مقاومة الملوحة بين اصناف مختلفة من الكينوا خلال مرحلة الانبات مع ملاحظة ان كل اصناف الكينوا التي قامو بدراستها تعد مقاومة للملوحة .

الخاتمة

الخاتمة

تعتبر آليات مقاومة النبات للملوحة ذات أهمية كبيرة في توفير معلومات حول أصناف النباتات قصد استغلالها في الإنتاج النباتي ، حيث قمنا بإجراء دراسة تأثير النقع بمنظم النمو الجبريلين GA3 على خصائص إنبات بعض الأصناف من بذور الكينوا (Q18) و(Q27) في وسط ملحي ، بهدف إبراز مدى مقاومة وتحمل الصنفين للتراكيز العالية من الملوحة و أي من الصنفين كان أكثر كفاءة وتحملا للملوحة العالية .

أكدت النتائج التي تحصلنا عليها تأثير الإجهاد الملحي على نمو البادرات مع اختلاف استجابة صنف الكينوا للملوحة، من خلال نتائج بعض المعايير المدروسة لعملية الإنبات (نسبة الإنبات ، مؤشر توتر الإنبات ، مؤشر توتر المادة الجافة ، سرعة الإنبات ، قوة نشاط البذور ، مؤشر توتر الملوحة وطول البادرات ووزانها الجافة و الطرية) حيث أبدت هذه الدراسة نتائج أكثر ايجابية عند الصنف (Q27) مقارنة بالصنف (Q18) وعليه يمكننا اعتبار الصنف (Q27) أكثر مقاومة للإجهاد الملحي .

جاءت دراستنا كمحاولة لإيجاد حلول نافعة لكبح هذا النوع من الإجهاد وذلك باستخدام هرمون الجبريلين GA3 نقعا لبذور صنفين من الكينوا ، حتى يكون للهرمون دور فعال يجب استعمال الوقت و الجرعة و التركيز المناسب لهذا الهرمون أثناء عملية النقع .

إن المعاملة بمنظم النمو الجبريلين GA3 نقعا قد ساعد النبات نسبيا على التغلب من اثار الملوحة ، كما نقترح في دراسات مستقبلية استخدام طرق أخرى للمعاملة كالرش وغيرها ، ومحاولة استعمال تراكيز أخرى سواء بالنسبة للملوحة NaCl أو الجبريلين GA3 أو استخدام املاح أخرى مثل كلوريد البوتاسيوم KCl وكلوريد الكالسيوم CaCl₂ ، كما نقترح أيضا استعمال منظمات نمو أخرى حيث نرى انه من الضروري إجراء دراسات يتم من خلالها استعمال أكثر من هرمون وبتراكيز مختلفة وذلك لتحديد أفضل التراكيز التي تؤدي إلى أفضل النتائج ولتحقيق التداخل الهرموني والتعاون بينها للتأثير على نمو ومردود النبات.

قائمة المراجع

قائمة المراجع

المراجع بالعربية :

- 1- احمد جابر موسى المريقى (2005): كيمياء نباتات البساتين كلية الزراعة جامعة الاسكندرية الطبعة الاولى ص226-231-232-234
- 2- الشثري عبد العزيز بن عبد الله (2018): نبات الكينوا، علوم غذاء وتغذية، المملكة العربية السعودية.
- 3- الشحات نصر ابو زيد (1990): الهرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية، قسم الزراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، شعبة البحوث الصيدلية والدوائية، المركز القومي بالقاهرة.
- 4- الشحات نصر ابو زيد (2000): الهرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية، الطبعة 2، الدار العربية للنشر
- 5- الشهباني إياد وجيه رؤوف (2006): أثر ملوحة مياه الري في نمو وحاصل البطاطا *Salanum tuberosum L* وأساليب التقليل منه، اطروحة دكتوراه، كلية الزراعة- جامعة بغداد، العراق.
- 6- باصلاح محمد عمر (1998): منظمات النمو النباتية و تشكل الضوء . دار رهام ،جدة، المملكة العربية السعودية .
- 7- بوشامة سولاف بو قزوح خديجة (2014): اثر الاجهاد الملحي على اصناف من العائبة الباقولية والعائلة النيجيلية المعاملة نقعا بالكينيتين اثناء مرحلة الانبات مذكرة لنيل شهادة الماستر في بيولوجيا وفسيلوجيا النبات تخصص القواعد البيولوجية للانتاج النباتي كلية علوم الطبيعة والحياة جامعة قسنطينة .

- 8- **بوعزيز محمد (1980):** استجابة أصناف القمح الصلب واللين للملوحة أثناء فترة الإنبات. رسالة دراسات عليا - جامعة قسنطينة.
- 9- **حراث ناعسة (2003):** دراسة وراثية التحطم الخلوي وسرعة فقد الماء الورقي عند القمح الصلب. رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة.
- 10- **حرزولي نزهاري و تليلي الطاهر (2019) :** مدى تأثير هرمون الجبرلين GA3 على انبات صنفين من نبات الكينوا تحت تراكيز من الملوحة ،تخصص التنوع البيئي و فزيولوجيا النبات ،كلية علوم الطبيعة و الحياة ، جامعة حمه لخضر الوادي .
- 11- **حشمت سليمان الداسوقي و / عبير حمدي الحكيم (2008):** اساسيات فزيولوجيا النبات العملية ، جامعة المنصورة جمهورية مصر العربية ، قسم النبات - كلية العلوم .
و جامعة سلمان بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية ،قسم الاحياء - كلية العلوم و الدراسات الانسانية
- 12- **حريش عبد العزيز (2018):** زراعة الكينوا، دليل الفلاح، المركز الدولي للزراعة المحلية، الإمارات العربية المتحدة
- 13- **خطاف عبد الكريم (2011) :** فصل و تحديد نواتج الايض الثانوي ودراسة الفعالية المضادة للاكسدة لنبته (*salsola tetragona del (chenopodiaceae)* مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،
- 14- **ربيع قبلان و جويل بريدي (2015):**المساعدة التقنية لتعزيز النظام الغذائي من الكينوا في الجزائر، مصر، العراق، إيران، لبنان، موريتانيا، السودان واليمن. المكتب القطري لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة.
- 15- **رمزية بنت سعد القحطاني (2004):** تأثير حمض الجبريليك وملوحة كلوريد الصوديوم على انبات البذور و النمو و الايض في نبات السنّا.رسالة ماجستير -جامعة الملك سعود

- 16- الزبيدي احمد حيدر(1989):ملوحة التربة، الأسس النظرية والتطبيقية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بيت الحكمة.
- 17- زغدي عفاف ومسعي عون عبد الغني (2019) :المساهمة في دراسة كفاءة انبات بذور ونمو بادرات صنفين من القمح الصلب (*Triticum durum Desf*) cirta و Vitron في ظروف الإجهاد الملحي (NaCl) ، مذكرة تخرج ماستر أكاديمي جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي.
- 18- سعيد محمود(2006): عن (بوشامة سلاف وبو قزوح خديجة) أثر الإجهاد الملحي على أصناف من العائلة البقولية و العائلة النجيلية المعاملة نقعا بالكينيتين أثناء مرحلة الإنبات، شهادة ماستر بيولوجيا و فيسيولوجيا النبات كلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة قسنطينة.
- 19- شنقارة بشير و العايش بوبكر (2018): مساهمة في دراسة تأثير المناخ المحلي على المحتوى الفينولي والنشاطية المضادة للاكسدة لنبات الحادة *cunulaca monacantha Del* النامي في منطقة وادي سوف . مذكرة لنيل شهادة ماستر اكاديمي ، جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي ، الجزائر
- 20- صباح غازي باجلان (2014): منظمات النمو النباتية النظري ، قسم البستنة وهندسة الحدائق /المرحلة الثالثة ، المحاضرة الرابعة ،كلية الزراعة جامعة كربلاء .
- 21- صفية شاكر معتوق (2015):إنتاج الحبوب الاستراتيجية في العراق وأثرها على الأمن الغذائي، مجلة أبحاث ميسان. المجلد11، العدد21 ،مركز دراسات البصرة والخليج العربي-جامعة البصرة.
- 22- طويل العرابي و شرائطة عبد الحميد(2018) : دراسة تأثير الاجهادات الملحية في خصائص انبات بذور بعض اصناف الكينوا. مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر اكاديمي. جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي

- 23- طويوي أمال، جميلي مريم (2014): تأثير حمض الجبريليك نقعا ورشا على نبات القمح الصلب صنف Vitron النامي تحت الظروف الملحية، بحث لنيل شهادة الماستر في فزيولوجيا النبات-جامعة قسنطينة.
- 24- عزام حسن (1977): أساسيات إنتاج المحاصيل الحقلية، محاصيل الحبوب و الحقول، دمشق.
- 25- عسيلا اسماعيل (2019) : محاضرة تكيف النباتات للإجهاد البيئي ،ماستر التنوع الحيوي وفزيولوجيا النبات ، كلية علوم الطبيعة و الحياة ، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي .
- 26- علي الحياي (2015) : انبات البذور اكثر نبات دراسات عليا جامعة ديالى العراق
- 27- علي كامل خطاب(2015):الكينوا يحل مشكلة الغذاء ملاحق علوم البيئية، ملاحق الخليج، الإمارات العربية المتحدة.
- 28- عمراني نسيمة (2006): النمو الخضري والمحتوى الكيميائي للقول المعامل بمنظمي النمو الكينتين والامينوغرين والنامي تحت ظروف الإجهاد الملحي، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة.
- 29- عيال عبد الوهاب ريسان وكريم رنا أحمد (2017): تأثير الإجهاد الملحي على بعض صفات النمو النباتية ودراسة بعض صفات البشرة لنباتي الريحان *Ocimumbasilicum* L والنعناع *Menthapiperita* L ، محافظة ذي قار، مجلة جامعة ذي قار، المجلد 12 العدد 1. كلية التربية للعلوم الصرفة ص. 32.
- 30- غروشة حسين (2019) : تنظيم النمو و التطور ,كلية علوم الطبيعة و الحياة ,جامعة منتوري -قسنطينة

- 31- غروشة حسين(2003): تأثير بعض منظمات النمو على إنتاج نباتات القمح النامية تحت ظروف الري بالمياه المالحة، رسالة دكتوراه الدولة في فيسيولوجيا النبات، كلية علوم الطبيعة والحياة جامعة منتوري ،قسنطينية.
- 32- فرشة عز الدين (2001): دراسة تأثير الملوحة على النمو وإنتاج القمح الصلب (*Triticum durum Defs*) وإمكانات معاكسة ذلك بواسطة الهرمونات النباتية (AG3, Kenitine)،رسالة ماجستير في فيسيولوجيا النبات، كلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة منتوري، قسنطينية.
- 33- كاظم عبد العظيم محمد (1985): علم النبات (الجزء الثاني)، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، دمشق.
- 34- الكردي فؤاد (1977) : اساسيات كيمياء الارض وخصوبتها ، مطبعة خالد ابن الوليد ، سوريا .
- 35- محب طه صقر (2002) :منظمات النمو النباتية ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة .
- 36- محمد حامد إدريس وصبحي درهاب(2009): فيسيولوجيا النبات موسوعة النبات، مركز سوزان مبارك الاستكشافي العلمي في القاهرة، مصر.
- 37- منيرة قادري(2018): محاضرة فيزيولوجيا النبات ، كلية العلوم الطبيعية و الحياة ،جامعة حمه لخضر - الوادي
- 38- وليد فؤاد أبو بطة (2016): الكينوا"أم الحبوب"، منظمة المجتمع العلمي العربي، مصر.
- 39- يخلف نادية(1991): تأثير الملوحة على نبات الفلفل الحلو، رسالة ماجستير. معهد علوم الطبيعة والحياة، جامعة قسنطينة
- المراجع باللغة الأجنبية :

- 40- **A. Karkanis, D. Bilalis, D Hela and E(2013):** Tsiplakou, G. Zervas, I. Kakabouk, Effects of fertilization and tillage system on growth and crude protein content of quinoa (*Chenopodium quinoa Willd.*) An alternative forage crop, 8.
- 41- **Adeline Gadenne (2014) :**Le quinoa :histoire, bienfaits et mode d'emploi,France.
- 42- **Alam S. et Azmi A. (1990):** Effet of salt stress on germination, growth, leaf anatomy and mineral element composition of wheat cultivars. Acta. Plant Physiol. p.117-203, 271.
- 43- **Atiet-Allah Dalila et SaidaniNour-Elhouda (2019):** Effets du stress salin sur la germination de quelques variétés introduites du quinoa (*Chenopodium quinoa Willd.*) et évaluation de certains indicateurs biochimiques de stress. Master biochimie appliquée. Sciencesbiologiques. Université Mohamed Khider de Biskra.Sciences exactes et Sciences de la nature et de vie.Biskra.:p: 5_41.
- 44- **Ben Naceur M., Rahmoune C., Sdiri H., Meddahi M., Selmi M., (2001):** Effet du stress salin sur la germination, la croissance et la production en grains de quelques variétés maghrébines de blé. Sècheresse, 12, 4,167-174.
- 45- **BENOIT.T(2013) :** Evaluation des impacts environnementaux des cultures de quinoa du projet Quinoa dans l'altiplano tarijeño (Bolivie) et propositions alternatives biologiques.
- 46- **Bernstein et Hayward. (1958):** Physiology of salt tolerance. Annu. Rev. plant . phisiol. P28-46 .
- 47- **Bultynck, L. & H. Lambers .(2004) :** Effects of applied gibberellic acid and paclobutrazol on leaf expansion and biomass allocation in two Aegilops species with contrasting leaf elongation rates.Physiol Plant 122: 143–151.
- 48- **Carmen d., (2008):** Diversité génétique et réponse aux contraintes du climat : une étude de cas à partir de la biologie des populations de quinoa (*chenopodium quinoa willd.*) de Bolivie ; thèse de docteur ; FACULTE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE GEMBLoux ; 157 P.
- 49- **Chaussat R (1999):** productions végétales :croissance et développement des plantes .Ed.,Paris :1-6p

- 50- **Cherki G, Foursy A., Fares K., (2002):** Effects of salt stress on growth, inorganic ion and proline accumulation in relation to osmotic adjustment in five sugar beet cultivars. *Exp. Bot.* 47, 39-5.
- 51- **Cronquist, A., (1981):** An integrated system of classification of flowering plants. Columbia University Press.
- 52- **Delauney A.J. et Verna D.P.S. (1993):** Proline biosynthesis and osmoregulation in plants. *Plant J.* 4: 215 -222 .
- 53- **Djerroudi Z.O ; Moulay B ; Samia H. (2010) :** Effect du stress salin sur l'accumulation de proline chez deux Espèces d'Atriplex halimus L. et Atriplex, canescens. *European journal of science arch*, 41(2). pp. 249-260.
- 54- **Edif, Zona Sopocachi(2013):** Descripteurs pour le Quinoa et ses espèces sauvages apparentées.
- 55- **FAO (1998) :** Under-utilized Andean Food Crops. Rome, Italy: FAO. <http://www.fao.org/quinoa-2014/what-is-quinoa/use/ar/>
- 56- **FAO,(2011) :** the state of food insecurity in the world. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. <http://www.Fao-Org>. Accessed 4 oct 2013.
- 57- **Gampine D.,(1992):** Etude de la germination et des plantules de quelques espèces spontanées des combrétacées et céralpiniacées au Burkinafaso. diplôme d'ingénieur du développement rural Burkinafaso. 120p
- 58- **Gandarillas H. (1979):** Botánica. In : Tapia M.E., Gandarillas H., Alandia S., Cardozo A., Mujica A., Ortiz R. et al., editors. *Andinos*. Bogotá, Colombia, Centro La quinua y la kaniwa: cultivos Internacionales de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), 20-44.
- 59- **Galaway N W. Leakey C la Price K R .Fenwick GR (1990):** Chemical composition and nutritional characteristics of quinoa food sciences and nutrition.
- 60- **Gandarillas H , (2014):** caracteres botánicos más importantes para la clasificación de la quinua. In: Universidad Nacional Técnica del Altiplano, editors. *Anales de la primera convención de Quenopodiaceas quinoa-canahua*. Puno, Perú.

- 61- **Groupe credit agricole du Maroc, (2014):** Fiche de synthèse QUINOA Une culture à fort potentiel d'adaptation et de production pour le Maroc.
- 62- **Guernier.(1983) :**Variation des teneurs en Na⁺et Ca⁺ débrayons et jeune plant lors de la germination en milieu sale .QYTON.43 (2)
- 63- **Hadj hammou bachir (2019):** etude de comportement agronomique de quelques varietes de quinoa (*chenopodium quinoa willd*).dans la region dadrar;zone de tsabit.master academique.université ahmed draia adrar.de sesiencs de la nature et de la vie.p:18.
- 64- **Hans- Werner Koyro, Sayed Said Eisa(2008):** Effect of salinity on composition, viability and germination of seeds of *Chenopodium quinoa*, plant soil, ,p 80.
- 65- **Hazegawa P.M; Bressan R.A; Zhu J.K; Bohnert H.J. (2000):** Plant cellular and molecular and molecular responses to high salinity. Annual Review of physiology and Molecular. Biology 51, pp463-499 .
- 66- **Heller P ,Lance.(1998):** physiologie végétale : 1 nutrition 6ème ed .Dunord p323.
- 67- **Herbillon Marie,(2015):** le quinoa :interet nutritionnel et perspectives pharmaceutiques.these pour le diplome d'état de docteur en pharmacie.universite de Rouen.
- 68- **Hopkins W.G., (2003):** Physiologie végétale, traduction de la 2ème édition par Serge Rambour. Edition De Boeck, Bruxelles, p: 309-332.
- 69- **Jancurova.m. mirnarovicova l.dandar a. (2009):**quinoa-a review.czech.foos sci.27:71-79.
- 70- **Kato N.,H., (1992):** An endogenous growth inhibitor 3- hydroxy-Bionone. I.Itsrol in light induced grow/h inhibitor of hypocotyls of phaseolusvulgaris.-physiol.plant.86:472 -475
- 71- **Khadri.K;Pliego.L;Soussi.M;Luch.C and Ocana.A.(2001):**A mononium assimilation anduriedmetabolisme in common bean(*Phaseolus vulgaris*) modules under saltstress.Agronomies,vol 21,INRA.Granda. p635.

- 72- **Khalid H ; Botany D ; Khalid N ; Khizar H.B ; M farrukh N. (2009)** :Effect of different levels of salinity on growth and ion contents of Blachk seeds (*Negella sativa*). Biol. Sci 1(3) : 135-138.
- 73- **Lafon jean-patrik,(1988)**:Biologie végétale des plantes cultivées ton 2.physiologie des développement –Génétique et améliorique Lavoisier:technique et documentation Paris.
- 74- **Lamothe, L. M., Srichuwong, S., Reuhs, B. L., & Hamaker, B. R. (2015)**: Quinoa (*Chenopodium quinoa W.*) and amaranth (*Amaranthus caudatus L.*) provide dietary fibres high in pectic substances and xyloglucans. Food Chemistry, 167(0), 490-496.
- 75- **Luttage (1983)** : Mineral nutrition : Slinity progress in botany Vol 45-Springer Verlge, Berlin. P76-86.
- 76- **Mallek-Maalej L., Boulasnem F., Lasnem F., Bensalem M., (1998)**:Effet de la salinité sur la germination de graines de céréales cultivées en Tunisie. Cahiers Agricultures, (2) 153-6
- 77- **Matiacevich, S.B.; M. L. Castellion; S. B. Maldonado; and M. P. Buera (2006)**: Water-dependent thermal transitions in quinoa embryos.ThermochimicaActa. 448: 117–122.
- 78- **Miranda, M., Vega-Gálvez, A., Uribe, E., López, J., Martínez, E., Rodríguez, M. J., . . . DiScala, K. (2011)**: Physico-chemical analysis, antioxidant capacity and vitamins of six ecotypes of chilean quinoa (*Chenopodium quinoa Willd*). Procedia Food Science, 1(0), 1439-1446.
- 79- **Montoya, L. ; Martínez, L. ; Paralta, J., (2005)**: Análisis de las variables estratégicas para la conformación de una cadena productiva de la quinua en Colombia. Journal Innovar. Edit. Unibiblos : v. 25, p. 103-119.
- 80- **Mujica A, Canahua A,(1989)** : Fasesfenologicas d'El cultivo de la quinua (*Chenopodium quinoa willdenow*). Un: Curso Taller Fenologia de cultivés andinos y ISO de la informacion agrométéorologica. Salsodo,7_10 agosto, INIAA, EEZA-ILLPA,PICA,PISA. puno, Perù. Pop:23_27.
- 81- **Mujica, A.; S.E. Jacobsen; J. Izquierodo, and J.P. Marathee (2001)**: Resultados de la prueba Americana y Europea de la Quinua.FAO, UNA-Puno, CIP: p 51.

- 82- **Munns R., Green-way H., Delame R. and Gibbs J., (1982):** Ion concentration and carbohydrate status of the elongating leaf tissue of (*Hordeumvulgare*) growing at high. External NaCl. II- Cause of the growth reduction. *J. Exp. Bot*, 33: 574-83.
- 83- **Munns Rana, Tester Mark.(2008)-** Mechanisms of salinity tolerance . *Annu.Rev . Plant boil*.
- 84- **Pacheco A., Morlon P. (1978):** Los sistemas radicluras de las plantas de interés económico en el Altiplano de Puno : un estudio preliminar. Proyecto de Investigación y Mejoramiento de las condiciones de desarrollo de la Agricultura del Altiplano de Puno, Peru.
- 85- **RADFORD A.E., AHLES H.E., and BELL C.R, (1968):** Manual of the vascular flora of the Carolina's, university of North Carolina press, Cappel Hill, NC.
- 86- **Risi c.j.; Galwey N.W. (1984):** The chenopodium grains of the Andes: ince crops for modern agriculture. *Adv.Appl.biol.*; 10;145-2016.
- 87- **Rodriguez. J. H, (2015):** La quinoa ,una opción para la nutrición del paciente con diabetes mellitus Ed; Centro de Atención del Instituto de Endocrinología. La Habana. Cuba, P 309.
- 88- **Rojas. W, José Luis. S et Carrasco. E, (2004) :** Study on the social, environmental and economic impacts of quinoa promotion in Bolivia. Ed; PROINPA Foundation La Paz. Bolivia. P13.
- 89- **Roosens. (1998);** Isolation of ornithine-animotransferase DNA and effect of salt on its expression in arabidopsis plant *physiol*. P117,203,271.
- 90- **S A Valencia-Chamorro(2004) ;** QUINOA, American Journal of plant sciences.
- 91- **Tapia, M. E. (1979):** "Historia y distribución geográfica, in Quinoa y Kañiwa. Cultivos Andinos," in Serie Libros y Materiales Educativos No 49, ed M. E. Tapia (Bogotá: Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas).
- 92- **Torres-Garcia, G.R., Escalante-Estrada, J.A., Rodríguez-Gonzalez, M. T., Ramirez-Ayala.C& D. Martínez-Moreno .(2009) :** Exogenous application of growth regulators in Snap Bean under water and salinity stress. *Journal of Stress Physiology&Biochemistry*, Vol. 5, No. 3, 2009, pp. 13-21.

- 93- **Touati I., (2018):** Etude de potentiel de croissance et de production de plusieurs variétés de quinoa (*Chenopodium quinoa Willd*) sous les conditions arides de sud de l'Algérie (Cas de Ouargla). Université Kasdimerbah. Ourgla.
- 94- **Valencia-Chamorro, S. A. (2003):** QUINOA. In B. Caballero (Ed.), Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Second Edition) (pp. 4895-4902). Oxford: Academic Press.
- 95- **Valencia-Chamorro, S. A. (2004):** QUINOA. In C. Wrigley (Ed.), Encyclopedia of Grain Science (pp. 1-8). Oxford: Elsevier.
- 96- **TURHAN, A., KUŞÇU, H., ŞENİZ, V., (2011);** Effects of different salt concentrations (NaCl) on germination of some spinach cultivars. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25.
- 97- **Chiraz D.G., Rajia K., Fatma G., Saloua R., Larbi K. et Mohamed N.R. (2011):** Euro. Journal. Sci. Research. 50(2), p208-217.
- 98- **Mouhammed H.B.K., Mehrmz S., Ohadi R., Mohsen M., Moussavinik et Amir P.L. (2011):.** Effect of salt (NaCl) stress on germination and early seedling growth of Spinach (*Spinacia oleracea L.*) Annal. Biol Research, 2 (4) :490-497.
- 99- **Mouhammad Arshadullah, Muhammad Suhaib, Malik Usama, Badar U-Zaman, Imdad Ali Mahmood, Syed Ishtiaq Hyder, (2016):** Effect of Salinity on Growth² of *Chenopodium Quiona Wild*. International Journal of Research in Agriculture and Forestry.
- 100- <http://www.institut.klorane-org/botanique/herbiers>
- 101- **vidal,a. Gladys,c.rigoberto,e. rember,p (2015)** :cataloge of commercial varieties of quinoa in peru national .library of peru n 2015-04587.
- 102- **Jacobsen,s ,e and stolen,o (1993)** :quinoa-morphology,phenology andprospects for its production as a new crop in Europe. European journal of agronomy, p19-29.
- 103- **Sayar r, bchini h ,Mosbahi m, khemira h (2010):** response of durum wheat (*triticum durum desf*) growth to salt and drought stresses .

الملاحق

نتائج الفروقات المعنوية و المجموعات للمعايير المدروسة :

1-نسبة الانبات :

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
Model	23	130333,33	5666,67	13,55	< 0.001
Error	48	20066,67	418,06		
Corrected Total	71	150400,00			

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
الجبريلين	1	50,00	50,00	0,12	0,73
الاصناف	1	2568,06	2568,06	6,14	0,02
التراكيز	5	118612,50	23722,50	56,74	< 0.001
الجبريلين*الاصناف	1	1012,50	1012,50	2,42	0,13
الجبريلين*التراكيز	5	704,17	140,83	0,34	0,89
الاصناف*التراكيز	5	4419,44	883,89	2,11	0,08
الجبريلين*الاصناف*التراكيز	5	2966,67	593,33	1,42	0,23

1-1- الجبريلين :

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
G0 vs G1	-1,67	-0,35	2,01	0,73	No
Tukey's d critical value:			2,84		

1-2-الاصناف :

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
V4 vs V7	-11,94	-2,48	2,01	0,02	Yes
Tukey's d critical value:			2,84		

1-3-التراكيز :

Contrast	Difference	Standardized	Critical	Pr > Diff	Significant
----------	------------	--------------	----------	-----------	-------------

	difference		value		
S4 vs S0	-100,00	-11,98	2,97	< 0.001	Yes
S4 vs S1	-100,00	-11,98	2,97	< 0.001	Yes
S4 vs S2	-73,75	-8,84	2,97	< 0.001	Yes
S4 vs S3	-28,75	-3,44	2,97	0,01	Yes
S4 vs S5	-12,50	-1,50	2,97	0,67	No
S5 vs S0	-87,50	-10,48	2,97	< 0.001	Yes
S5 vs S1	-87,50	-10,48	2,97	< 0.001	Yes
S5 vs S2	-61,25	-7,34	2,97	< 0.001	Yes
S5 vs S3	-16,25	-1,95	2,97	0,39	No
S3 vs S0	-71,25	-8,54	2,97	< 0.001	Yes
S3 vs S1	-71,25	-8,54	2,97	< 0.001	Yes
S3 vs S2	-45,00	-5,39	2,97	< 0.001	Yes
S2 vs S0	-26,25	-3,14	2,97	0,03	Yes
S2 vs S1	-26,25	-3,14	2,97	0,03	Yes
S1 vs S0	0,00	0,00	2,97	1,00	No

1-4- الجبريلين الاصناف :

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
G1*V4 vs G1*V7	-19,44	-2,85	2,66	0,03	Yes
G1*V4 vs G0*V7	-10,28	-1,51	2,66	0,44	No
G1*V4 vs G0*V4	-5,83	-0,86	2,66	0,83	No
G0*V4 vs G1*V7	-13,61	-2,00	2,66	0,20	No
G0*V4 vs G0*V7	-4,44	-0,65	2,66	0,91	No
G0*V7 vs G1*V7	-9,17	-1,34	2,66	0,54	No
Tukey's d critical value:			3,76		

2- سرعة الانبات :

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
Model	23	5,67	0,25	3,28	< 0.001
Error	48	3,61	0,08		
Corrected Total	71	9,28			

Source	DF	Sum of	Mean	F	Pr > F
--------	----	--------	------	---	--------

		squares	squares		
الجبريلين	1	0,15	0,15	1,99	0,17
الاصناف	1	0,00	0,00	0,01	0,93
التراكيز	5	3,49	0,70	9,27	< 0.001
الجبريلين*الاصناف	1	0,04	0,04	0,52	0,47
الجبريلين*التراكيز	5	0,41	0,08	1,08	0,38
الاصناف*التراكيز	5	0,45	0,09	1,20	0,32
الجبريلين*الاصناف*التراكيز	5	1,13	0,23	3,02	0,02

: 1-2- الجبريلين

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
G0 vs G1	-0,09	-1,41	2,01	0,17	No
Tukey's d critical value:			2,84		

: 2-2- الاصناف

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
V4 vs V7	-0,01	-0,09	2,01	0,93	No
Tukey's d critical value:			2,84		

: 3-2- التراكيز

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
S4 vs S3	-0,65	-5,80	2,97	< 0.001	Yes
S4 vs S2	-0,58	-5,21	2,97	< 0.001	Yes
S4 vs S1	-0,29	-2,60	2,97	0,12	No
S4 vs S5	-0,29	-2,59	2,97	0,12	No
S4 vs S0	-0,22	-1,94	2,97	0,39	No
S0 vs S3	-0,43	-3,86	2,97	0,00	Yes
S0 vs S2	-0,37	-3,27	2,97	0,02	Yes
S0 vs S1	-0,07	-0,65	2,97	0,99	No
S0 vs S5	-0,07	-0,65	2,97	0,99	No
S5 vs S3	-0,36	-3,21	2,97	0,03	Yes

S5 vs S2	-0,29	-2,62	2,97	0,11	No
S5 vs S1	0,00	-0,01	2,97	1,00	No
S1 vs S3	-0,36	-3,21	2,97	0,03	Yes
S1 vs S2	-0,29	-2,61	2,97	0,11	No
S2 vs S3	-0,07	-0,60	2,97	0,99	No

4-2- الجبريلين التراكيز:

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
G0*V7 vs G1*V7	-0,14	-1,51	2,66	0,44	No
G0*V7 vs G1*V4	-0,08	-0,93	2,66	0,79	No
G0*V7 vs G0*V4	-0,04	-0,44	2,66	0,97	No
G0*V4 vs G1*V7	-0,10	-1,06	2,66	0,71	No
G0*V4 vs G1*V4	-0,04	-0,49	2,66	0,96	No
G1*V4 vs G1*V7	-0,05	-0,58	2,66	0,94	No
Tukey's d critical value:			3,76		

3- قوة نشاط البذور:

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
Model	23	7806589,99	339416,96	14,70	< 0.001
Error	48	1108074,71	23084,89		
Corrected Total	71	8914664,70			

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
الجبريلين	1	10887,96	10887,96	0,47	0,50
الاصناف	1	17759,84	17759,84	0,77	0,38
التراكيز	5	7263151,17	1452630,23	62,93	< 0.001
الجبريلين*الاصناف	1	47807,47	47807,47	2,07	0,16
الجبريلين*التراكيز	5	137450,19	27490,04	1,19	0,33
الاصناف*التراكيز	5	222900,27	44580,05	1,93	0,11
الجبريلين*الاصناف*التراكيز	5	106633,09	21326,62	0,92	0,47

3-1- الجبريلين :

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
G1 vs G0	-24,59	-0,69	2,01	0,50	No
Tukey's d critical value:			2,84		

3-2- الاصناف :

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
V4 vs V7	-31,41	-0,88	2,01	0,38	No
Tukey's d critical value:			2,84		

3-3- التراكيز :

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
S4 vs S0	-909,58	-14,66	2,97	< 0.001	Yes
S4 vs S1	-325,08	-5,24	2,97	< 0.001	Yes
S4 vs S5	-99,96	-1,61	2,97	0,60	No
S4 vs S2	-93,69	-1,51	2,97	0,66	No
S4 vs S3	-14,03	-0,23	2,97	1,00	No
S3 vs S0	-895,56	-14,44	2,97	< 0.001	Yes
S3 vs S1	-311,06	-5,01	2,97	< 0.001	Yes
S3 vs S5	-85,93	-1,39	2,97	0,74	No
S3 vs S2	-79,67	-1,28	2,97	0,79	No
S2 vs S0	-815,89	-13,15	2,97	< 0.001	Yes
S2 vs S1	-231,39	-3,73	2,97	0,01	Yes
S2 vs S5	-6,27	-0,10	2,97	1,00	No
S5 vs S0	-809,63	-13,05	2,97	< 0.001	Yes
S5 vs S1	-225,13	-3,63	2,97	0,01	Yes
S1 vs S0	-584,50	-9,42	2,97	< 0.001	Yes
Tukey's d critical value:			4,2		

3-4- الجبريلين الاصناف :

Contrast	Difference	Standardized	Critical	Pr > Diff	Significant
----------	------------	--------------	----------	-----------	-------------

	difference		value		
G1*V4 vs G1*V7	-82,95	-1,64	2,66	0,37	No
G1*V4 vs G0*V4	-76,13	-1,50	2,66	0,44	No
G1*V4 vs G0*V7	-56,01	-1,11	2,66	0,69	No
G0*V7 vs G1*V7	-26,94	-0,53	2,66	0,95	No
G0*V7 vs G0*V4	-20,12	-0,40	2,66	0,98	No
G0*V4 vs G1*V7	-6,82	-0,13	2,66	1,00	No
Tukey's d critical value:			3,76		

4- مؤشر توتر الانبات:

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
Model	11	10,04	0,91	4,39	0,00
Error	24	4,99	0,21		
Corrected Total	35	15,03			

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
الاصناف	1	0,65	0,65	3,12	0,09
التراكيز	5	5,45	1,09	5,24	0,00
الاصناف*التراكيز	5	3,94	0,79	3,79	0,01

4-1- الاصناف:

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
V7 vs V4	-0,27	-1,77	2,06	0,09	No
Tukey's d critical value:			2,92		

4-2- التراكيز:

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
S4 vs S2	-0,91	-3,45	3,09	0,02	Yes
S4 vs S1	-0,87	-3,29	3,09	0,03	Yes
S4 vs S0	-0,75	-2,85	3,09	0,08	No
S4 vs S3	-0,27	-1,03	3,09	0,90	No
S4 vs S5	0,00	0,00	3,09	1,00	No
S5 vs S2	-0,91	-3,45	3,09	0,02	Yes
S5 vs S1	-0,87	-3,29	3,09	0,03	Yes
S5 vs S0	-0,75	-2,85	3,09	0,08	No
S5 vs S3	-0,27	-1,03	3,09	0,90	No
S3 vs S2	-0,64	-2,42	3,09	0,19	No
S3 vs S1	-0,59	-2,25	3,09	0,25	No
S3 vs S0	-0,48	-1,82	3,09	0,47	No
S0 vs S2	-0,16	-0,60	3,09	0,99	No
S0 vs S1	-0,12	-0,44	3,09	1,00	No
S1 vs S2	-0,04	-0,16	3,09	1,00	No
Tukey's d critical value:			4,37		

5- مؤشر توتر الملوحة:

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
Model	11	9,33	0,85	4,61	< 0.001
Error	24	4,41	0,18		
Corrected Total	35	13,74			

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
الإصناف	1	0,18	0,18	1,00	0,33
التراكيز	5	8,14	1,63	8,86	< 0.001
الإصناف*التراكيز	5	1,00	0,20	1,09	0,39

5-1- الإصناف:

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
V4 vs V7	-0,14	-1,00	2,06	0,33	No

Tukey's d critical value:	2,92
---------------------------	------

5-2- التراكيز :

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
S4 vs S0	-1,17	-4,73	3,09	0,00	Yes
S4 vs S1	-1,12	-4,50	3,09	0,00	Yes
S4 vs S2	-0,70	-2,84	3,09	0,08	No
S4 vs S3	-0,39	-1,59	3,09	0,61	No
S4 vs S5	0,00	0,00	3,09	1,00	No
S5 vs S0	-1,17	-4,73	3,09	0,00	Yes
S5 vs S1	-1,12	-4,50	3,09	0,00	Yes
S5 vs S2	-0,70	-2,84	3,09	0,08	No
S5 vs S3	-0,39	-1,59	3,09	0,61	No
S3 vs S0	-0,78	-3,14	3,09	0,04	Yes
S3 vs S1	-0,72	-2,91	3,09	0,07	No
S3 vs S2	-0,31	-1,25	3,09	0,81	No
S2 vs S0	-0,47	-1,89	3,09	0,43	No
S2 vs S1	-0,41	-1,66	3,09	0,57	No
S1 vs S0	-0,06	-0,23	3,09	1,00	No
Tukey's d critical value:			4,37		

5-3- الاصناف و التراكيز :

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
V4*S4 vs V4*S0	-1,23	-3,51	3,61	0,06	No
V4*S4 vs V4*S1	-1,20	-3,42	3,61	0,07	No
V4*S4 vs V7*S0	-1,11	-3,18	3,61	0,12	No
V4*S4 vs V7*S2	-1,10	-3,14	3,61	0,13	No
V4*S4 vs V7*S1	-1,03	-2,95	3,61	0,18	No
V4*S4 vs V7*S3	-0,57	-1,62	3,61	0,89	No
V4*S4 vs V4*S2	-0,31	-0,88	3,61	1,00	No
V4*S4 vs V4*S3	-0,22	-0,63	3,61	1,00	No
V4*S4 vs V4*S5	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V4*S4 vs V7*S4	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V4*S4 vs V7*S5	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V4*S5 vs V4*S0	-1,23	-3,51	3,61	0,06	No
V4*S5 vs V4*S1	-1,20	-3,42	3,61	0,07	No
V4*S5 vs V7*S0	-1,11	-3,18	3,61	0,12	No
V4*S5 vs V7*S2	-1,10	-3,14	3,61	0,13	No

V4*S5 vs V7*S1	-1,03	-2,95	3,61	0,18	No
V4*S5 vs V7*S3	-0,57	-1,62	3,61	0,89	No
V4*S5 vs V4*S2	-0,31	-0,88	3,61	1,00	No
V4*S5 vs V4*S3	-0,22	-0,63	3,61	1,00	No
V4*S5 vs V7*S4	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V4*S5 vs V7*S5	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V7*S4 vs V4*S0	-1,23	-3,51	3,61	0,06	No
V7*S4 vs V4*S1	-1,20	-3,42	3,61	0,07	No
V7*S4 vs V7*S0	-1,11	-3,18	3,61	0,12	No
V7*S4 vs V7*S2	-1,10	-3,14	3,61	0,13	No
V7*S4 vs V7*S1	-1,03	-2,95	3,61	0,18	No
V7*S4 vs V7*S3	-0,57	-1,62	3,61	0,89	No
V7*S4 vs V4*S2	-0,31	-0,88	3,61	1,00	No
V7*S4 vs V4*S3	-0,22	-0,63	3,61	1,00	No
V7*S4 vs V7*S5	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V7*S5 vs V4*S0	-1,23	-3,51	3,61	0,06	No
V7*S5 vs V4*S1	-1,20	-3,42	3,61	0,07	No
V7*S5 vs V7*S0	-1,11	-3,18	3,61	0,12	No
V7*S5 vs V7*S2	-1,10	-3,14	3,61	0,13	No
V7*S5 vs V7*S1	-1,03	-2,95	3,61	0,18	No
V7*S5 vs V7*S3	-0,57	-1,62	3,61	0,89	No
V7*S5 vs V4*S2	-0,31	-0,88	3,61	1,00	No
V7*S5 vs V4*S3	-0,22	-0,63	3,61	1,00	No
V4*S3 vs V4*S0	-1,01	-2,88	3,61	0,21	No
V4*S3 vs V4*S1	-0,98	-2,79	3,61	0,25	No
V4*S3 vs V7*S0	-0,89	-2,55	3,61	0,36	No
V4*S3 vs V7*S2	-0,88	-2,51	3,61	0,38	No
V4*S3 vs V7*S1	-0,81	-2,32	3,61	0,49	No
V4*S3 vs V7*S3	-0,35	-0,99	3,61	1,00	No
V4*S3 vs V4*S2	-0,09	-0,25	3,61	1,00	No
V4*S2 vs V4*S0	-0,92	-2,64	3,61	0,31	No
V4*S2 vs V4*S1	-0,89	-2,54	3,61	0,36	No
V4*S2 vs V7*S0	-0,81	-2,30	3,61	0,50	No
V4*S2 vs V7*S2	-0,79	-2,27	3,61	0,52	No
V4*S2 vs V7*S1	-0,73	-2,08	3,61	0,64	No
V4*S2 vs V7*S3	-0,26	-0,74	3,61	1,00	No
V7*S3 vs V4*S0	-0,66	-1,89	3,61	0,75	No
V7*S3 vs V4*S1	-0,63	-1,80	3,61	0,80	No
V7*S3 vs V7*S0	-0,55	-1,56	3,61	0,91	No
V7*S3 vs V7*S2	-0,53	-1,52	3,61	0,92	No
V7*S3 vs V7*S1	-0,47	-1,33	3,61	0,97	No
V7*S1 vs V4*S0	-0,20	-0,56	3,61	1,00	No
V7*S1 vs V4*S1	-0,16	-0,47	3,61	1,00	No
V7*S1 vs V7*S0	-0,08	-0,23	3,61	1,00	No
V7*S1 vs V7*S2	-0,07	-0,19	3,61	1,00	No
V7*S2 vs V4*S0	-0,13	-0,37	3,61	1,00	No
V7*S2 vs V4*S1	-0,10	-0,28	3,61	1,00	No
V7*S2 vs V7*S0	-0,01	-0,04	3,61	1,00	No
V7*S0 vs V4*S0	-0,12	-0,34	3,61	1,00	No

V7*S0 vs V4*S1	-0,08	-0,24	3,61	1,00	No
V4*S1 vs V4*S0	-0,03	-0,10	3,61	1,00	No
Tukey's d critical value:			5,1		

6- مؤشر نوتر المادة الجافة:

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
Model	11	10,54	0,96	1,44	0,22
Error	24	15,94	0,66		
Corrected Total	35	26,48			

Source	DF	Sum of squares	Mean squares	F	Pr > F
الاصناف	1	0,12	0,12	0,19	0,67
التراكيز	5	10,18	2,04	3,06	0,03
الاصناف*التراكيز	5	0,24	0,05	0,07	1,00

6-1- الاصناف:

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
V4 vs V7	-0,12	-0,43	2,06	0,67	No
Tukey's d critical value:			2,92		

6-2- التراكيز:

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
S4 vs S2	-1,44	-3,05	3,09	0,05	No
S4 vs S1	-0,97	-2,05	3,09	0,34	No
S4 vs S0	-0,91	-1,93	3,09	0,41	No
S4 vs S3	-0,37	-0,79	3,09	0,97	No
S4 vs S5	0,00	0,00	3,09	1,00	No

S5 vs S2	-1,44	-3,05	3,09	0,05	No
S5 vs S1	-0,97	-2,05	3,09	0,34	No
S5 vs S0	-0,91	-1,93	3,09	0,41	No
S5 vs S3	-0,37	-0,79	3,09	0,97	No
S3 vs S2	-1,06	-2,26	3,09	0,25	No
S3 vs S1	-0,59	-1,26	3,09	0,80	No
S3 vs S0	-0,54	-1,14	3,09	0,86	No
S0 vs S2	-0,53	-1,12	3,09	0,87	No
S0 vs S1	-0,06	-0,12	3,09	1,00	No
S1 vs S2	-0,47	-1,00	3,09	0,91	No
Tukey's d critical value:			4,37		

3-6-الإصناف و التراكيز:

Contrast	Difference	Standardized difference	Critical value	Pr > Diff	Significant
V4*S4 vs V7*S2	-1,63	-2,45	3,61	0,41	No
V4*S4 vs V4*S2	-1,24	-1,86	3,61	0,77	No
V4*S4 vs V4*S1	-0,99	-1,49	3,61	0,93	No
V4*S4 vs V7*S0	-0,95	-1,43	3,61	0,94	No
V4*S4 vs V7*S1	-0,94	-1,41	3,61	0,95	No
V4*S4 vs V4*S0	-0,86	-1,29	3,61	0,97	No
V4*S4 vs V7*S3	-0,51	-0,76	3,61	1,00	No
V4*S4 vs V4*S3	-0,24	-0,36	3,61	1,00	No
V4*S4 vs V4*S5	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V4*S4 vs V7*S4	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V4*S4 vs V7*S5	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V4*S5 vs V7*S2	-1,63	-2,45	3,61	0,41	No
V4*S5 vs V4*S2	-1,24	-1,86	3,61	0,77	No
V4*S5 vs V4*S1	-0,99	-1,49	3,61	0,93	No
V4*S5 vs V7*S0	-0,95	-1,43	3,61	0,94	No
V4*S5 vs V7*S1	-0,94	-1,41	3,61	0,95	No
V4*S5 vs V4*S0	-0,86	-1,29	3,61	0,97	No
V4*S5 vs V7*S3	-0,51	-0,76	3,61	1,00	No
V4*S5 vs V4*S3	-0,24	-0,36	3,61	1,00	No
V4*S5 vs V7*S4	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V4*S5 vs V7*S5	0,00	0,00	3,61	1,00	No
V7*S4 vs V7*S2	-1,63	-2,45	3,61	0,41	No
V7*S4 vs V4*S2	-1,24	-1,86	3,61	0,77	No
V7*S4 vs V4*S1	-0,99	-1,49	3,61	0,93	No
V7*S4 vs V7*S0	-0,95	-1,43	3,61	0,94	No
V7*S4 vs V7*S1	-0,94	-1,41	3,61	0,95	No
V7*S4 vs V4*S0	-0,86	-1,29	3,61	0,97	No
V7*S4 vs V7*S3	-0,51	-0,76	3,61	1,00	No
V7*S4 vs V4*S3	-0,24	-0,36	3,61	1,00	No
V7*S4 vs V7*S5	0,00	0,00	3,61	1,00	No

V7*S5 vs V7*S2	-1,63	-2,45	3,61	0,41	No
V7*S5 vs V4*S2	-1,24	-1,86	3,61	0,77	No
V7*S5 vs V4*S1	-0,99	-1,49	3,61	0,93	No
V7*S5 vs V7*S0	-0,95	-1,43	3,61	0,94	No
V7*S5 vs V7*S1	-0,94	-1,41	3,61	0,95	No
V7*S5 vs V4*S0	-0,86	-1,29	3,61	0,97	No
V7*S5 vs V7*S3	-0,51	-0,76	3,61	1,00	No
V7*S5 vs V4*S3	-0,24	-0,36	3,61	1,00	No
V4*S3 vs V7*S2	-1,40	-2,10	3,61	0,63	No
V4*S3 vs V4*S2	-1,00	-1,50	3,61	0,93	No
V4*S3 vs V4*S1	-0,76	-1,14	3,61	0,99	No
V4*S3 vs V7*S0	-0,72	-1,08	3,61	0,99	No
V4*S3 vs V7*S1	-0,70	-1,05	3,61	0,99	No
V4*S3 vs V4*S0	-0,62	-0,94	3,61	1,00	No
V4*S3 vs V7*S3	-0,27	-0,41	3,61	1,00	No
V7*S3 vs V7*S2	-1,13	-1,69	3,61	0,85	No
V7*S3 vs V4*S2	-0,73	-1,10	3,61	0,99	No
V7*S3 vs V4*S1	-0,49	-0,73	3,61	1,00	No
V7*S3 vs V7*S0	-0,45	-0,67	3,61	1,00	No
V7*S3 vs V7*S1	-0,43	-0,65	3,61	1,00	No
V7*S3 vs V4*S0	-0,35	-0,53	3,61	1,00	No
V4*S0 vs V7*S2	-0,77	-1,16	3,61	0,99	No
V4*S0 vs V4*S2	-0,38	-0,57	3,61	1,00	No
V4*S0 vs V4*S1	-0,13	-0,20	3,61	1,00	No
V4*S0 vs V7*S0	-0,09	-0,14	3,61	1,00	No
V4*S0 vs V7*S1	-0,08	-0,12	3,61	1,00	No
V7*S1 vs V7*S2	-0,70	-1,05	3,61	0,99	No
V7*S1 vs V4*S2	-0,30	-0,45	3,61	1,00	No
V7*S1 vs V4*S1	-0,06	-0,08	3,61	1,00	No
V7*S1 vs V7*S0	-0,02	-0,02	3,61	1,00	No
V7*S0 vs V7*S2	-0,68	-1,02	3,61	1,00	No
V7*S0 vs V4*S2	-0,28	-0,43	3,61	1,00	No
V7*S0 vs V4*S1	-0,04	-0,06	3,61	1,00	No
V4*S1 vs V7*S2	-0,64	-0,96	3,61	1,00	No
V4*S1 vs V4*S2	-0,24	-0,37	3,61	1,00	No
V4*S2 vs V7*S2	-0,40	-0,60	3,61	1,00	No
Tukey's d critical value:			5,1		